

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome FEDERICA Cognome COSTANZA Telefono 0112467114-131 e-mail fe.costanza@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc</p> <p>N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p>SS Cure Domiciliari, Distretto Nord-Est Via Spalato,14 Torino</p> <p>9.00-12.00 8.00-20.00 Infermieri, coordinatore infermieristico PC, saletta per incontro studenti Sala mensa, accesso internet</p>
<p>Contatti e riferimenti</p>	<p>Indirizzo Via Spalato, 14, Torino Telefono 0112467114/0112467031 Fax 011201568</p>
<p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	

Allegato 1
Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Cardiovascolari	X
Cardiopatie, vasculopatie, ipertensione	
Malattie Cerebrovascolari	X
Ictus, demenze, sclerosi multipla, morbo di Parkinson	
Malattie Endocrinologiche, metaboliche	X
Diabete mellito	
Malattie Intestinali / digestive	X
Neoplasie	
Malattie Nefrologiche, genito/urinarie	X
Insufficienze renali, neoplasie	
Malattie Neuromuscolari	X
Neuropatie, sclerosi laterale amiotrofica, distrofie	
Malattie Oncologiche	X
K gastrico, mammella, colon-retto, polmonare, cerebrale	
Malattie Osteoarticolari	X
Artrosi, artropatie	
Malattie Respiratorie	X
BPCO, tumori, insufficienza respiratoria, tumori	
Malattie Traumatologiche / incidenti	X
Fissatori esterni	

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...) X Perdita reale o percepita di persone significative X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento 	
Aspirazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia) X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: dentizione inadeguata 	



Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina) X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispasia broncopolmonare) X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica) <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche) X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza) X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria) X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali 	
Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) X Squilibri biochimici, neurofisiologici <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento 	
Cadute, rischio	X
Vedere lesione, rischio	

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Modello di coping inefficace X Salute fisica compromessa X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari X Durata dell'assistenza richiesta X Isolamento X Pause di riposo/svago insufficienti o X Risorse economiche insufficienti X Assenza o non disponibilità di sostegno <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare) 	
Casa, compromessa gestione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze. X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno X Perdita di un familiare X Deficit di conoscenze X Insufficienza di risorse economiche <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali) 	
Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio X Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale. X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer) 	

- X Paralisi delle corde vocali, tetraplegia
- X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)

Trattamenti

- X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana (perdite uditive)

Concetto di se, disturbo del

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Immobilità o perdita di funzioni
- X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)

Confusione mentale acuta

X

Fattori correlati

Fattori di rischio

Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per

- X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)
- X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)
- X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)
- X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)
- X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)
- X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)
- X Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Dolore, fecaloma, immobilità,
- X Depressione, situazioni non familiari

Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Presenza di batteri, virus, tossine
- X Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)
- X Stati patologici pre-esistenti

Fasi di sviluppo

- X Persone anziane

Coping inadeguato della famiglia	X
Fattori correlati Biofisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica	
Coping inefficace	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) <input checked="" type="checkbox"/> Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale) <input checked="" type="checkbox"/> Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione) <input checked="" type="checkbox"/> Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Criticità delle relazioni con genitori/caregiver <input checked="" type="checkbox"/> Disorganizzazione del sistema familiare <input checked="" type="checkbox"/> Inefficace capacità di problem solving <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi) Fasi di sviluppo . <input checked="" type="checkbox"/> Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani. <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche	
Cura di sé, deficit (alimentazione)	X
Incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni <input checked="" type="checkbox"/> portare il cibo alla bocca	
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	



<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input checked="" type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input checked="" type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	

<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione</p>	

<ul style="list-style-type: none"> X Affaticamento X Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
--

<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X servirsi del gabinetto/comoda X trasferirsi sul gabinetto/comoda X eseguire pratiche igieniche adeguate X pulire il gabinetto o la comoda X sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) X Spasticità o flaccidità per (specificare) X Debolezza muscolare per (specificare) X Paralisi per (specificare) X Atrofia per (specificare) X Contratture muscolari per (specificare) X Stato comatoso X Disturbi visivi X Arti non funzionanti o mancanti X Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	

<p>Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare)</p> <ul style="list-style-type: none"> X usare il telefono X accedere ai mezzi di trasporto X lavare e stirare X preparare i pasti X fare la spesa X gestire il denaro X assumere i farmaci 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) X Spasticità o flaccidità per (specificare) X Debolezza muscolare per (specificare) X Paralisi per (specificare) X Atrofia per (specificare) X Contratture muscolari per (specificare) X Stato comatoso X Disturbi visivi 	

<p>X Arti non funzionanti o mancanti X Deficit somatiformi</p> <p>Trattamenti X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali) X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale</p> <p>Fasi di sviluppo X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>
--

Deambulazione, compromissione, rischio	X
Vedere mobilità, compromissione, rischio	

Deglutizione, compromissione	X
-------------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) X Tumore / edema tracheo-esofageo X Irritazione della cavità orofaringea X Diminuzione della salivazione</p> <p>Trattamenti X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica</p> <p>Situazionali (personali, ambientali) X Alterazione del livello di coscienza X Fatigue</p> <p>Fasi di sviluppo X Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto</p>
--

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) X Cancro X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. X Effetti di un tumore su (specificare)</p> <p>Trattamenti X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali) X Febbre X Immobilità/posizionamento inappropriato</p>

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) X Cancro X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. X Fatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella) X Effetti di un tumore su (specificare) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Febbre X Immobilità/posizionamento inappropriato 	
Eliminazione urinaria compromessa	X
<p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) X Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) 	
Fatigue	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS) X Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito) X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di 	

(specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia,
 X Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)
- X Disturbi del sonno

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento

Trattamenti

- X variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)

Immobilizzazione, sindrome da
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Riduzione del sensorio
- X Stato di incoscienza
- X Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale)
- X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)
- X Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia)
- X Cancro

Situazionali (personali, ambientali)

- X Fatigue
- X Stato di debilitazione
- X Dolore
- X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile

Incontinenza fecale
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)
- X Compromissione delle funzioni cognitive
- X Iperdistensione rettale per stipsi cronica
- X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla).

Situazionali (personali, ambientali)

- X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)

Incontinenza urinaria da sforzo
X

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: perdita di tono muscolare

Incontinenza urinaria da urgenza	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana:diminuita capacità vescicale 	
Incontinenza urinaria funzionale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della mobilità X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	
Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della mobilità X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	

Infezione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) 	
Insonnia	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica) X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria) X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Eccessivo dormire di giorno X Inadeguata attività fisica durante il giorno X Dolore cronico X Risposte ansiose X Paura 	
Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia,. 	
Integrità mucosa orale, compromissione	X
Fattori correlati <ul style="list-style-type: none"> X Incapacità di provvedere all'igiene orale 	
Ipertermia	X
Fattori correlati Situazionali <ul style="list-style-type: none"> X Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa 	

Ipotermia	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività) Fasi di sviluppo X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano)	
Lesione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope) X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito) X Fatigue X Ipotensione ortostatica X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) Trattamenti X Lungo allettamento X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorellassanti...specificare) X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone Situazionali (personali, ambientali) X Diminuzione o perdita memoria a breve termine X Pericoli domestici (pavimenti sdruciolevoli, scale, illuminazione insufficiente, ingressi/corridoi non sicuri, bagno, giocattoli non sicuri, impianto elettrico difettoso, veleni conservati in modo improprio) X Disattenzione del caregiver X Uso improprio degli ausili X Andatura instabile Fasi di sviluppo X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare	
Liquidi, eccessivo volume di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema) X Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite) X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie) Trattamenti X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica) Situazionali (personali, ambientali) X Eccessivo apporto di sodio/liquidi X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione) X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta) Fasi di sviluppo X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare	

Liquidi, insufficiente volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato) X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Vomito/nausea X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue) X Dieta scorretta/digiuno X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete 	
Memoria, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico) X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento) X Deficienze nutrizionali <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inadeguata stimolazione X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni) 	
Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale) X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache) X rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco) X edemi X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso) X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X fatigue X obesità X mancanza di motivazione X dispnea X dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare 	

Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
Nausea	X
Trattamenti X Effetti della chemioterapia e/o farmaci	
Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi) X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato Trattamenti X Effetti collaterali della terapia X Terapia complessa non controllata/prolungata Situazionali (personali, ambientali) X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)	
Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS) X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari) X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) X Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica) Trattamenti X Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia) Situazionali (personali, ambientali) X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie) X Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto) X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta) X Diarrea	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia) Trattamenti	



<ul style="list-style-type: none"> X Soppressione del riflesso della tosse X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)
--

Stipsi	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza) X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo) X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale) X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti collaterali di farmaci (specificare) X Uso abituale di lassativi <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata X Incapacità di percepire i segnali intestinali 	

Stress, sovraccarico psicofisico	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Perdite funzionali 	

Trauma, rischio Vedere rischio di lesione	X
--	----------

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse

(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per ileo paralitico	X
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Il tirocinio presso il servizio di Cure Domiciliari è caratterizzato dalla presa in carico globale dell'assistito di varie fasce d'età, che non può prescindere dalla valutazione del contesto sociale, familiare ed ambientale, con modalità di case management (gestione del caso). Compatibilmente con le possibilità dell'assistito, il progetto assistenziale implica in modo imprescindibile la sua condivisione tra la famiglia e le figure professionali coinvolte. Il conseguente percorso educativo porterà al raggiungimento del migliore grado di autonomia possibile. Il tirocinio pone inoltre lo studente nelle condizioni di rivalutare le modalità di applicazione delle conoscenze e capacità già acquisite, dovendole adattare ad un contesto domiciliare, che differisce dall'ambito ospedaliero per alcune caratteristiche: setting, contratto assistenziale, passaggio di competenze tecniche e cognitive al care-giver.

Lo studente è costantemente affiancato da un infermiere nelle attività assistenziali ed organizzative.

La necessità di interfacciarsi con il medico di medicina generale, specialisti territoriali e/o ospedalieri, con operatori dei servizi sociali, allo scopo di creare un progetto multidisciplinare rispondente alle necessità dell'assistito, richiede all'infermiere (che spesso opera solo) la capacità di lavorare creando condivisione e confronto costante.

Lo studente avrà inoltre la possibilità di conoscere ed utilizzare la cartelle integrata, documento che compilano le varie figure professionali coinvolte nel progetto assistenziale.

Un'altra opportunità offerta allo studente è quella di vedere un'assistenza con la modalità dell'infermiere di riferimento (del caso).

Si segnala inoltre la presenza di protocolli aziendali e/o interni utilizzati dal servizio e le riunioni con le OSS della cooperativa e con i medici palliativisti con cadenza bimensile.