

## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome <b>MASSIMO</b> Cognome <b>BRANDINO</b> Telefono 011/4393764; 011/4393702 e-mail massimo.brandino@unito.it</p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SC GERIATRIA</li> <li>• P.O. AMEDEO DI SAVOIA/BIRAGO DI VISCHE</li> <li>• PAD. G</li> <li>• CORSO SVIZZERA 164 TORINO</li> <li>• Secondo l'atto aziendale ad ora vigente, la S.C. Geriatria, quale area degenziale, è inserita a matrice nel Dipartimento Strutturale Medico.</li> <li>• L'unità operativa è strutturata con nove camere di degenza da uno o quattro posti letto per un totale di 24 posti letto di degenza ordinaria più quattro attivabili in caso di emergenza.</li> <li>• Apertura al pubblico: dalle ore 13.00 alle ore 20.30 continuato</li> <li>• Attualmente l'equipe clinico-assistenziale è composta, oltre che dal Direttore di Struttura complessa, dalla Responsabile S.O.S. e dalla Coordinatrice Infermieristica, da 12 infermieri, 9 OSS, 1 infermiere generico, 6 medici ed una amministrativa.</li> <li>• Profilo orario: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ mattino ore 7.00- 14.42</li> <li>➤ Pomeriggio ore 14.31 – 22.35</li> <li>➤ Notte ore 22.25 – 7.10</li> </ul> </li> </ul>

<p><b>Contatti e riferimenti</b></p> <p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Risorse strumentali:<ul style="list-style-type: none"><li>➤ emogasanalizzatrice</li><li>➤ apparecchio radiologico portatile</li><li>➤ sfigmomanometro</li><li>➤ fonendoscopio</li><li>➤ termometro auricolare</li><li>➤ pompe infusionali</li><li>➤ pompe enterali</li><li>➤ defibrillatore cardiologico</li></ul></li><li>▪ Servizi agli studenti<ul style="list-style-type: none"><li>➤ spogliatoio ubicato all'interno del reparto</li><li>➤ mensa ubicata di fronte al Pad Cottolengo all'interno del Comprensorio</li><li>➤ accesso ad internet presso l'infermeria del reparto</li></ul></li></ul> <p>Indirizzo: Corso Svizzera 164 Torino Telefono 011 4393702 / 011 4393764 Fax 011 4393770</p> <p><b>Parcheggi e accesso auto:</b> il parcheggio è consentito solo all'esterno dell'Ospedale. L'area esterna è gratuita</p> <p><b>Tram e Bus:</b> fermata di fronte all'ospedale in corso Svizzera : linee del tram <b>3</b> e <b>9</b></p> <p>I biglietti sono in vendita presso il bar davanti all'entrata dell'ospedale.</p> <p><b>Metropolitana:</b> Piazza Bernini poi proseguire con il tram 9</p> <p><b>Stazioni Ferroviarie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>FS Porta Nuova km 3,5</b> Fermata Corso Svizzera prendere tram <b>9</b> in direzione Torino Esposizioni per 10 fermate. Scendere alla fermata PORTA NUOVA FS oppure scendere in P.zza Bernini e proseguire con la Metropolitana.</li></ul>
---	---

- **FS Porta Susa km 1,5**
- Fermata di Via Cibrario angolo Via Boncompagni  
Prendere tram **13** in direzione Gran Madre per 5 fermate.  
Scendere alla fermata Porta Susa FS oppure prendere il tram **9** in direzione Torino Esposizioni scendere in P.zza Bernini e proseguire con la Metropolitana
- **FS Torino Dora km 2,6**
- Fermata di Via Cibrario angolo Via Boncompagni  
Prendere l'autobus urbano **71** in direzione piazza Statuto per 4 fermate. Scendere alla fermata Statuto, Prendere l'autobus urbano **49** in direzione Cimitero per 4 fermate, Scendere alla fermata Dora FS

**Aeroporto: Città di Torino – Caselle Torinese km 16,6**

Prendere il tram **9** in direzione Stampalia. Scendere alla fermata L.go Grosseto Nord. Recarsi alla fermata: L.go Grosseto Nord, V.Venaria angolo C.Grosseto. Prendere l'autobus **11** in direzione Lamarmora per 2 fermate. Scendere alla fermata Madonna di Campagna. Recarsi alla **Stazione Ferroviaria GTT Torino - Madonna di Campagna**. Prendere la linea ferroviaria **Torino –Ceres** in direzione Ceres. Scendere alla fermata Caselle Aeroporto.

**Autostrade:** Tutte da **Tangenziale Nord** - svincolo Corso Regina Margherita km 6

**Parcheggio Taxi:** di fronte al centro Pier della Francesca C.so Svizzera tel. 011. Oppure In corso Tassoni, angolo via Cibrario, tel.

**Allegato 1**
**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

**Dipendenze patologiche** **X**

alcolismo

**Malattie Cardiovascolari** **X**

 Scompenso cardiaco  
 Fibrillazione atriale  
 Ischemia miocardica  
 Arteriopatie  
 Ipertensione arteriosa  
 Aneurismi arteriosi

**Malattie Cerebrovascolari** **X**

 Deterioramento cognitivo  
 Demenze vascolari  
 Alzheimer  
 Tumori cerebrali

**Malattie Endocrinologiche, metaboliche** **X**

 Sindromi dismetaboliche  
 Diabete tipo 2  
 Ipotiroidismo  
 Ipertiroidismo

**Malattie Intestinali / digestive** **X**

 Cancro colon  
 Cancro retto  
 Ulcera gastrica  
 epatopatie

**Malattie Infettive** **X**

SEPSI

<b>Malattie Nefrologiche, genito/urinarie</b>	<b>X</b>
INFEZIONE DELLE VIE URINARIE INSUFFICIENZA RENALE CRONICA	
<b>Malattie Neuromuscolari</b>	<b>X</b>
MORBO DI PARKINSON ICTUS CEREBRALE	
<b>Malattie Oncologiche</b>	<b>X</b>
CANCRO DDEL PROSTATA CANCRO DELLA VESCICA CANCRO DEL COLON	
<b>Malattie Osteoarticolari</b>	<b>X</b>
ARTROSI ARTRITI RAA	
<b>Malattie Respiratorie</b>	<b>X</b>
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA IN BPCO ATALETTASIE POLMONARI POLMONITI BRONCHITI	
<b>Malattie Traumatologiche / incidenti</b>	<b>X</b>
TRAUMA DA CADUTA	
<b>Altro (specificare)</b>	<b>X</b>
ASSISTENZIALITA'	

**Allegato 2**
**Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate**

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Ansia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Perdita reale o percepita di persone significative X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...) <b>Fasi di sviluppo</b> X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento	

<b>Aspirazione, rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Riduzione del livello di coscienza ( per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia) X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo X Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo) X Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina) X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonia, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè) X Compromissione dei riflessi protettivi ( chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia) <b>Trattamenti</b> X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo <b>Fasi di sviluppo</b> X Persona anziana: dentizione inadeguata	

Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)</li> <li>X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopulmonare)</li> <li>X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</li> </ul> <p><b>Aumento del fabbisogno metabolico per</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)</li> <li>X Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche)</li> <li>X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)</li> <li>X Compromissione del trasporto dell'ossigeno ( per ipovolemia, prolungato riposo a letto)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario,insufficiente conoscenza)</li> <li>X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)</li> <li>X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali</li> </ul>	

Autolesionismo, automutilazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale)</li> </ul> <p><b>Personali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Pregressi episodi di autolesionismo</li> <li>X Abusi fisici, psichici, o sessuali</li> <li>X Inefficaci capacità di coping</li> <li>X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti</li> </ul>	

Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)</li> <li>X Deturpazione</li> <li>X Squilibri biochimici, neurofisiologici</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li>X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)</li> <li>X Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)</li> </ul>	

- X Relazioni abusive
- X Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli
- X Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento

**Avvelenamento, rischio**

Vedere lesione, rischio

**X**
**Cadute, rischio**

Vedere lesione, rischio

**X**
**Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di**
**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)

**Trattamenti**

- X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver
- X Modello di coping inefficace
- X Salute fisica compromessa
- X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari
- X Durata dell'assistenza richiesta
- X Isolamento
- X Pause di riposo/svago insufficienti o
- X Risorse economiche insufficienti
- X Assenza o non disponibilità di sostegno

**Fasi di sviluppo**

- X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare)

**Casa, compromessa gestione**
**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.
- X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno
- X Perdita di un familiare
- X Deficit di conoscenze
- X Insufficienza di risorse economiche

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali)





<b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione</b> (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	<b>X</b>
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>X Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia</li> <li>X Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio</li> <li>X Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale.</li> <li>X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)</li> <li>X Paralisi delle corde vocali, tetraplegia</li> <li>X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)</li> </ul>	
<b>Trattamenti</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)</li> </ul>	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita attenzione (per affaticamento, collera, ansia, o dolore)</li> <li>X Mancata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento</li> <li>X Barriere psicologiche (paura, timidezza)</li> <li>X Mancanza di riservatezza</li> <li>X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)</li> </ul>	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana (perdite uditive)</li> <li>X Compromissione cognitiva per demenza (specificare patologia)</li> </ul>	

<b>Concetto di se, disturbo del</b>	<b>X</b>
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</li> </ul>	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>X Immobilità o perdita di funzioni</li> <li>X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</li> </ul>	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)</li> </ul>	

<b>Confusione mentale acuta</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fattori di rischio</b> Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per <ul style="list-style-type: none"> <li>X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)</li> <li>X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)</li> <li>X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)</li> <li>X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)</li> <li>X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)</li> <li>X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidi, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)</li> <li>X Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.</li> <li>X Dolore, fecaloma, immobilità,</li> <li>X Depressione, situazioni non familiari</li> <li>X Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)</li> </ul>	

<b>Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Presenza di batteri, virus, tossine</li> <li>X Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)</li> <li>X Stati patologici pre-esistenti</li> <li>X Genere</li> <li>X Storia di fumo</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persone anziane</li> </ul>	

<b>Coping inadeguato della famiglia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Biofisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli</li> <li>X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli</li> </ul>	

<b>Coping inefficace</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)</li> <li>X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)</li> <li>X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)</li> <li>X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione</li> <li>X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver</li> <li>X Disorganizzazione del sistema familiare</li> <li>X Inefficace capacità di problem solving</li> <li>X Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress</li> <li>X Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, trasloco, povertà, disastro naturale)</li> <li>X Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)</li> <li>X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche</li> </ul>	

<b>Cura di sé, deficit (alimentazione)</b>	<b>X</b>
<p><b>Incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni</li> <li>X portare il cibo alla bocca</li> </ul>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li>X Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li>X Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li>X Paralisi per (specificare)</li> <li>X Atrofia per (specificare)</li> <li>X Contratture muscolari per (specificare)</li> <li>X Stato comatoso</li> <li>X Disturbi visivi</li> <li>X Arti non funzionanti o mancanti</li> <li>X Comportamenti ritualistici</li> <li>X Deficit somatici</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li> <li>X Affaticamento e dolore post operatori</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Deficit cognitivi</li> <li>X Dolore</li> <li>X Scarsa motivazione</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>X Affaticamento</li> <li>X Confusione mentale</li> <li>X Ansia che paralizza</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>
---

<p><b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b></p> <p><b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X lavare il proprio corpo o parti</li> <li>X procurarsi l'acqua</li> <li>X regolare la temperatura o il flusso dell'acqua</li> <li>X percepire il bisogno di cure igieniche</li> </ul>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li>X Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li>X Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li>X Paralisi per (specificare)</li> <li>X Atrofia per (specificare)</li> <li>X Contratture muscolari per (specificare)</li> <li>X Stato comatoso</li> <li>X Disturbi visivi</li> <li>X Arti non funzionanti o mancanti</li> <li>X Regressione a un precedente stadio di sviluppo</li> <li>X Comportamenti ritualistici</li> <li>X Deficit somatici</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li> <li>X Affaticamento e dolore post operatori</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Deficit cognitivi</li> <li>X Dolore</li> <li>X Scarsa motivazione</li> <li>X Affaticamento</li> <li>X Confusione mentale</li> <li>X Ansia che paralizza</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>	

<p><b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b></p> <p><b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti</li> <li>X curare il proprio aspetto</li> <li>X acquistare o cambiare capi di vestiario</li> <li>X o il flusso dell'acqua</li> <li>X percepire il bisogno di cure igieniche</li> </ul>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</li> <li>X Spasticità o flaccidità per (specificare)</li> <li>X Debolezza muscolare per (specificare)</li> <li>X Paralisi per (specificare)</li> <li>X Atrofia per (specificare)</li> </ul>	



- X Contratture muscolari per (specificare)
- X Stato comatoso
- X Disturbi visivi
- X Arti non funzionanti o mancanti
- X Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- X Comportamenti ritualistici
- X Deficit somatici

**Trattamenti**

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Deficit cognitivi
- X Dolore
- X Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

**Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)**

**Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):**

- X servirsi del gabinetto/comoda
- X trasferirsi sul gabinetto/comoda
- X eseguire pratiche igieniche adeguate
- X pulire il gabinetto o la comoda
- X sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)
- X Spasticità o flaccidità per (specificare)
- X Debolezza muscolare per (specificare)
- X Paralisi per (specificare)
- X Atrofia per (specificare)
- X Contratture muscolari per (specificare)
- X Stato comatoso
- X Disturbi visivi
- X Arti non funzionanti o mancanti
- X Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- X Comportamenti ritualistici
- X Deficit somatici

**Trattamenti**

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Deficit cognitivi
- X Dolore
- X Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

<b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b> <b>Difficoltà a (specificare)</b> <input checked="" type="checkbox"/> usare il telefono <input checked="" type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input checked="" type="checkbox"/> lavare e stirare <input checked="" type="checkbox"/> preparare i pasti <input checked="" type="checkbox"/> fare la spesa <input checked="" type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Regressioni a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici <b>Trattamenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	
<b>Deambulazione, compromissione, rischio</b> <b>Vedere mobilità, compromissione, rischio</b>	<b>X</b>
<b>Deglutizione, compromissione</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) <input checked="" type="checkbox"/> Irritazione della cavità orofaringea <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione della salivazione <b>Trattamenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Alterazione del livello di coscienza <input checked="" type="checkbox"/> Fatigue <b>Fasi di sviluppo</b> <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto	

<b>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</b>	X
---	---

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)</li> <li>X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)</li> <li>X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li>X Fatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)</li> <li>X Effetti di un tumore su (specificare)</li> <li>X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</li> <li>X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)</li> <li>X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Febbre</li> <li>X Immobilità/posizionamento inappropriato</li> <li>X Iperattività</li> <li>X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li>X Risposta allergica</li> <li>X Irritanti chimici</li> <li>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li>X Ansia grave e repressa</li> </ul>
---

<b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>	X
---	---

<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)</li> <li>X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)</li> <li>X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li>X Fatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)</li> <li>X Effetti di un tumore su (specificare)</li> <li>X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</li> <li>X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)</li> <li>X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Febbre</li> <li>X Immobilità/posizionamento inappropriato</li> <li>X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li>X Irritanti chimici</li> <li>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li>X Ansia grave e repressa</li> </ul>
---



<b>Eliminazione urinaria compromessa</b>	<b>X</b>
<p><b>Per Incontinenza urinaria (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</li> <li>X Da sforzo ( perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)</li> <li>X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)</li> <li>X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)</li> <li>X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)</li> <li>X Da rigurgito ( presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</li> </ul>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)</li> <li>X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)</li> </ul>	
<b>Eminegligenza</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazione delle capacità percettive secondaria ictus cerebrale, tumore cerebrale, lesione/trauma cranico, aneurisma cerebrale</li> </ul>	
<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza)</li> <li>X Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)</li> <li>X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)</li> <li>X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla., SLA, M. Parkinson, AIDS)</li> <li>X Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore</li> <li>X Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito)</li> <li>X Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)</li> <li>X Stress emotivo</li> <li>X Disturbi del sonno</li> </ul>	



<b>Immagine corporea, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità,</li> </ul>	
<b>Immobilizzazione, sindrome da</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Depressione</li> <li>X Fatigue</li> <li>X Stato di debilitazione</li> <li>X Dolore</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile</li> </ul>	
<b>Incontinenza fecale</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle funzioni cognitive</li> <li>X Iperdistensione rettale per stipsi cronica</li> <li>X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)</li> <li>X Trattamenti</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)</li> </ul>	
<b>Incontinenza urinaria da urgenza</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana:diminuita capacità vescicale</li> </ul>	



<b>Incontinenza urinaria funzionale</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della mobilità</li> <li>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> <li>X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</li> </ul>	
<b>Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria</li> <li>X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della mobilità</li> <li>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> <li>X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</li> </ul>	
<b>Infezione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare)</li> <li>X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità</li> <li>X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</li> </ul>	



<b>Insonnia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)</li> <li>X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)</li> <li>X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</li> <li>X Eccessivo dormire di giorno</li> <li>X Depressione</li> <li>X Inadeguata attività fisica durante il giorno</li> <li>X Dolore cronico</li> <li>X Risposte ansiose</li> <li>X Modifiche ambientali (specificare)</li> <li>X Paura</li> </ul>	
<b>Integrità mucosa orale, compromissione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inadeguata igiene orale</li> <li>X Incapacità di provvedere all'igiene orale</li> </ul>	
<b>Ipertermia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età</li> </ul>	
<b>Ipotermia</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano)</li> </ul>	
<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)</li> <li>X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)</li> <li>X Fatigue</li> <li>X Ipotensione ortostatica</li> <li>X Insufficienza vertebro basilare</li> <li>X Disturbi vestibolari</li> <li>X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Lungo allettamento</li> <li>X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)</li> <li>X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p>	

- X Diminuzione o perdita memoria a breve termine
- X Alterata capacità di giudizio ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
- X Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- X Scarpe inadatte,
- X Disattenzione del caregiver
- X Uso improprio degli ausili
- X Storia di incidenti
- X Andatura instabile

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

**Liquidi, eccessivo volume di**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Iperensione portale, diminuzione della pressione colloido-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica,. Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

**Trattamenti**

- X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)
- X Ristagno venoso declive/venostasi ( per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

**Liquidi, insufficiente volume di**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)
- X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea,

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Vomito/nausea
- X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)
- X Dieta scorretta/digiuno
- X Nutrizione per sonda con soluzione concentrata
- X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)
- X Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)
- X Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

<b>Memoria, compromissione</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni del SNC ( per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico</li> <li>X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento</li> <li>X Deficienze nutrizionali</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)</li> <li>X Mancanza di motivazione</li> <li>X Inadeguata stimolazione</li> <li>X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni)</li> </ul>	
<b>Mobilità, compromissione /rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare ( malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale)</li> <li>X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)</li> <li>X rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco)</li> <li>X edemi</li> <li>X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)</li> <li>X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X fatigue</li> <li>X obesità</li> <li>X mancanza di motivazione</li> <li>X dispnea</li> <li>X dolore</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare</li> </ul>	
<b>Nausea</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, malessere da movimento, stress) (specificare)</li> </ul>	

<b>Non adesione (a indicazioni terapeutiche)</b>	<b>X</b>
--	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)</li> <li>X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti collaterali della terapia</li> <li>X Terapia complessa non controllata/prolungata</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)</li> </ul>	
---	--

<b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)</li> <li>X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)</li> <li>X Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)</li> <li>X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)</li> <li>X Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)</li> <li>X Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)</li> <li>X Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)</li> <li>X Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)</li> <li>X Inappetenza per reflusso gastroesofageo</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)</li> <li>X Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)</li> <li>X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)</li> <li>X Diarrea</li> </ul>	
--	--

<b>Nutrizione superiore al fabbisogno</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterato modello di sazietà (specificare)</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico</li> </ul>	
---	--

<b>Respirazione, inefficace funzionalità, rischio</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo)</li> <li>X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)</li> <li>X Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo)</li> </ul>
--

<b>Soffocamento, rischio Vedere rischio di lesione</b>	<b>X</b>
--	----------

<b>Stipsi</b>	<b>X</b>
---------------	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza)</li> <li>X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iper paratiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo)</li> <li>X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)</li> <li>X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)</li> <li>X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare</li> <li>X Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile</li> <li>X Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti collaterali di farmaci (specificare)</li> <li>X Uso abituale di lassativi</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)</li> <li>X Modello di evacuazione irregolare</li> <li>X Mancanza di riservatezza</li> <li>X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata</li> <li>X Valutazioni errate</li> <li>X Incapacità di percepire i segnali intestinali</li> </ul>
--

<b>Stress, sovraccarico psicofisico</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)</li> <li>X Necessità di far fronte a morte</li> </ul>
--



- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia)</li> <li>X Perdite funzionali</li> </ul> |
|---|

<b>Trasloco, stress da</b>	<b>X</b>
----------------------------	----------

- |   |
|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Abbandono</li> <li>X Modifica delle relazioni familiari</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: necessità della vicinanza dei familiari per l'assistenza, ammissione in struttura di assistenza</li> </ul> |
|---|

<b>Trasferimento, compromissione, rischio</b> Vedere mobilità, compromissione, rischio	<b>X</b>
---	----------

<b>Trauma, rischio</b> Vedere rischio di lesione	<b>X</b>
---	----------



**Allegato 3**
**PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI**

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse

(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per sindrome compartimentale	X
RC per embolia polmonare	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria</b>	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
RC per costrizione tracheobronchiale	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per bilancio azotato negativo	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rc per trombocitopenia	X
RC per infezioni opportunistiche	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria</b>	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per crisi convulsiva	X
RC per ipertensione intraoculare	X
RC per astinenza da alcol	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per ileo paralitico	X
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X



<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica</b>	
RC per fratture patologiche	<b>X</b>
RC per lussazione	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	<b>X</b>



## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

**In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.**

CARATTERISTICA PECULIARE DELLA S.C. GERIATRIA E' LA PRESA IN CARICO E LA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE DELLA PERSONA ASSISTITA. LA PARTICOLARE FRAGILITA' PSICO-FISICA E SOCIALE DELL'ASSISTITO RICHIEDE L'IMPLEMENTAZIONE DI UN PERCORSO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE PERSONALIZZATO CHE LA GERIATRIA HA SVIPLUPPATO CON EFFICACIA.