

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	<p> Nome GIULIA Cognome CHIOMENTO Telefono 011/4393701 e-mail giulia.chiomento@unito.it </p> <p> Nome CINZIA Cognome NOVIELLO Telefono 011/4393701 e-mail vincenza.noviello@unito.it </p>
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	<p>S.C. Medicina per intensità di cure 1 p.o. Amedeo di Savoia/Birago di Vische</p> <p>Il reparto si estende in un unico corridoio, dando le spalle all'entrata, a sinistra ci sono le stanze di degenza (6 camere da 4 letti e 4 camere singole ubicate a metà del corridoio) per un totale di 28 posti letto.</p> <p>Sul lato opposto ci sono i locali di servizio. Dall'entrata troviamo il bancone della segreteria, il bagno per i visitatori, un vuotavasi, il deposito materiale, la medicheria.</p> <p>A metà reparto si trova un ascensore per accedere alla S.C. Geriatria, di fronte in una zona rientrante troviamo il carrello delle urgenze, l'armadio anti-incendio, la fotocopiatrice, l'armadio contenente i presidi per il supporto all'attività respiratoria, di fronte si trova un armadio con materiale quale scodelle, bicchieri e presidi per le pulizie.</p> <p>Oltre l'ascensore troviamo lo studio medico-infermieristico, la cucina, lo studio della coordinatrice infermieristica, il guardaroba, un vuotatasi, il deposito per il materiale sporco ed infetto.</p> <p>Alla fine del corridoio due porte frangi fuoco creano un locale di passaggio con uscita d'emergenza. Qui si trova il magazzino del materiale stoccato e il locale della cappa per la preparazione dei farmaci citostatici. Oltre la seconda porta frangi fuoco si trovano i locali del servizio ambulatoriale: studi, degenza, zona segreteria, camera visite. Al fondo del reparto è situato l'ambulatorio fisiatrico.</p> <p>Gli orari di apertura per i visitatori sono: dalle 13.00 alle 14.30 e la sera dalle 19.00 alle 20.30.</p> <p>È permesso ad un parente di entrare fuori orario, dalle ore 13.00 alle 20.30, se ritenuto opportuno e a secondo del caso clinico, se i parenti desiderano possono fare assistenza notturna o mandare una persona di loro fiducia. Il permesso</p>

viene effettuato dalla coordinatrice infermieristica.

Il personale ruota su tre turni:

- mattino dalle 7.00 alle 14.42.
- pomeriggio dalle 14.32 alle 22.35.
- notte dalle 22.25 alle 7.10.

Il personale è composto da:

Dirigente medico II livello
6 Dirigenti medici di I livello
Coordinatrice Infermieristica di reparto
Coordinatrice Infermieristica del servizio di ambulatorio.
16 infermieri (tre a tempo parziale)
9 O.S.S.
2 segretari

Oltre al personale della struttura interagiscono, quotidianamente: medico fisiatra, fisioterapista, nutrizionista, dietologa, assistente sociale.

In reparto sono presenti 4 monitor con telemetria (video in medicheria), pompe infusionali e enterali, elettrocardiografi, presidi per la mobilizzazione (alzammati, teli di scivolamento, barelle, carrozzine, girelli, deambulatore).

Il reparto è organizzato secondo la metodologia della piccola équipe, ogni settore è dotato di un carrello per la terapia e un carrello per l'igiene.

In reparto è presente un carrello in medicheria per le procedure tecniche (C.V.C., C.V., S.N.G., paracentesi, toracentesi, posizionamento drenaggi toracici, addominali, prelievo di liquor).

In ambulatorio è presente un carrello dedicato per biopsie ossee, strisci ematici, ecc.

Ogni posto letto è dotato di flussometro per O₂ terapia e ampolla per aspirazione. Ogni camera è dotata di bagno che si trova nell'anticamera.

Lo studente può recarsi in mensa per la pausa pranzo, altrimenti può portarsi il cibo da casa o acquistare i buoni pasto per la mensa. La sera la mensa è chiusa e si permette allo studente di mangiare in reparto.

Allo studente è assegnato un armadietto nello spogliatoio del personale.

Gli studenti possono usufruire del computer della medicheria per attività di ricerca nelle ore pomeridiane.

Allo studente sono rilasciati i numeri di reparto e la mail del tutor clinico.

Quando il tutor clinico è assente lo studente fa riferimento all'infermiere affiancatore e alla coordinatrice di reparto.

Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici
prevalentemente trattati**
Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Dipendenze patologiche	X
-------------------------------	----------

Potus attivo o pregresso
 T.D. attivi o pregressi.

Disabilità, malattie ad alto grado di tutela	X
---	----------

Malattie Cardiovascolari	X
---------------------------------	----------

Scompenso cardiaco
 Fibrillazione atriale
 Ischemia miocardica
 Arteriopatie
 Ipertensione arteriosa
 Aneurismi arteriosi

Malattie Cerebrovascolari	X
----------------------------------	----------

Pregressi ictus
 Deterioramento cognitivo
 Demenze vascolari
 Alzheimer
 Tumori cerebrali

Malattie Endocrinologiche, metaboliche	X
---	----------

Sindromi dismetaboliche
 Diabete tipo 2
 Ipotiroidismo
 Ipertiroidismo

Malattie Intestinali / digestive	X
---	----------

Malattie da male assorbimento: M. di Chron, Rettocolite ulcerosa, reflusso gastro-esofageo, ulcere gastriche, duodenali, Esofago di Barrett operato, ,
 K colon
 K retto
 epatopatia

Malattie Infettive	X
Clostridium difficile Klebsiella Aspergilo Stafilocco Streptococco. Epatiti A, B, C. Sepsis	
Malattie Nefrologiche, genito/urinarie	X
Nefropatie, malattie renali: insufficienza renale cronica e acuta. Infezione delle vie urinarie	
Malattie Neuromuscolari	X
Parkinson Ictus cerebrale	
Malattie Oncologiche	X
Ca di tutti gli apparati, pazienti in fase terminale già seguiti dalle cure palliative ma con problematiche di gestione a domicilio.	
Malattie Osteoarticolari	X
Osteoporosi, MTS ossee, cadute con traumi muscolari. Artrosi artriti	
Malattie Rare	X
Malattie reumatologiche di pazienti seguiti dal Dirigente medico di I livello – ricoveri programmati.	
Malattie Respiratorie	X
Insufficienza respiratoria tipo 1 e 2. EPA Dispnea ingravescenti, polmoniti, versamenti pleurici, bronchiti.	
Malattie Traumatologiche / incidenti	X
Pazienti anziani con fratture non operabili, fratture con presidi di blocco (gessi, docce, desault), fratture operate, inviati per presenza di patologie internistiche.	
Salute Mentale	X
Pazienti con patologie psichiatriche ricoverati per problemi internistici	
Altro (specificare)	X
Pazienti anziani e grandi anziani con problematiche di gestione a domicilio.	

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri). X Perdita reale o percepita di persone significative X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) X Cambiamento ambientale reale o percepito (ospedalizzazione, pensionamento, rischi per la sicurezza). <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento 	
Aspirazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni). X Depressione dei riflessi della tosse e faringeo X Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo) X Aumento della pressione gastrica per ascite, obesità. X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, M. di Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè). X Fistola tracheo-esofagea X Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale) X Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: dentizione inadeguata 	



Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina) X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare) X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica) <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici) X Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche) X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza) X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria) X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali 	

Autolesionismo, automutilazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale) <p>Personali</p> <ul style="list-style-type: none"> X Pregressi episodi di autolesionismo X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti 	

Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) X Deturpazione X Squilibri biochimici, neurofisiologici <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, separazione da una persona significativa) X Senso di fallimento (aumento/diminuzione del peso, diminuzione dell'autonomia per l'età avanzata) 	

<p>X Istituzionalizzazione</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento</p> <p>X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento</p>

<p>Avvelenamento, rischio</p> <p>Vedere lesione, rischio</p>	X
---	----------

<p>Cadute, rischio</p> <p>Vedere lesione, rischio</p>	X
--	----------

<p>Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di</p>	X
--	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver</p> <p>X Modello di coping inefficace</p> <p>X Salute fisica compromessa</p> <p>X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</p> <p>X Durata dell'assistenza richiesta</p> <p>X Isolamento</p> <p>X Pause di riposo/svago insufficienti o</p> <p>X Risorse economiche insufficienti</p> <p>X Assenza o non disponibilità di sostegno</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (malattie mentali) o disabilità fisiche (pazienti anziani non autosufficienti)</p>
--

<p>Casa, compromessa gestione</p>	X
--	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Modificazioni delle capacità funzionali per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.</p> <p>X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno</p> <p>X Perdita di un familiare</p> <p>X Deficit di conoscenze</p> <p>X Insufficienza di risorse economiche</p>



Fasi di sviluppo

- X Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali)

**Comunicazione, compromissione e
Comunicazione verbale, compromissione**

X

(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia
- X Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio
- X Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale.
- X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)
- X Paralisi delle corde vocali, tetraplegia
- X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)

Trattamenti

- X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC, demenza, malattie neurologiche)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuita attenzione (per affaticamento, collera, ansia, o dolore)
- X Mandata disponibilità di apparecchio acustico o o malfunzionamento
- X Barriere psicologiche (paura, timidezza)
- X Mancanza di riservatezza
- X Barriera linguistica

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana (perdite uditive)
- X Compromissione cognitiva per (M. Alzheimer, M. Parkinson, Ictus)

Concetto di se, disturbo del

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa
- X Immobilità o perdita di funzioni
- X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)

Confusione mentale acuta	X
Fattori correlati Fattori di rischio Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per <ul style="list-style-type: none"> X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia) X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio) X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale) X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano) X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidi, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale) X Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio. X Dolore, fecaloma, immobilità, X Depressione, situazioni non familiari X Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...) 	

Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Presenza di batteri, virus, tossine X Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali) X Stati patologici pre-esistenti X Genere X Storia di fumo Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Fattori fisici: condizioni climatiche, area geografica X Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria X Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori) Bioterrorismo X Tipo di lavoro X Pratiche dietetiche Contaminazione accidentale o intenzionale di riserve alimentari o idriche X Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persone anziane 	

Coping inadeguato della famiglia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Biofisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per <u>dipendenza da sostanze</u>, scarsa autostima, <u>alcolismo</u>, <u>storia di relazioni inefficaci con i propri genitori</u>, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive) X Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai figli 	
Coping inefficace	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale) X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione) X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver X Disorganizzazione del sistema familiare X Inefficace capacità di problem solving X Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress X Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, trasloco, povertà, disastro naturale) X Rottura legami affettivi (<u>morte</u>, <u>separazione</u>, <u>diserzione</u>, <u>carcere</u>, <u>istituzionalizzazione</u>, <u>adozione/affidamento</u>) X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani. X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche 	



<p>Cura di sé, deficit (alimentazione)</p> <p>Incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni <input checked="" type="checkbox"/> portare il cibo alla bocca 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	
<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</p> <p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input checked="" type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input checked="" type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici 	

<p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) X Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale X Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	
<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</p> <p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti X curare il proprio aspetto X acquistare o <u>cambiare</u> capi di vestiario o <u>il flusso dell'acqua</u> X percepire il bisogno di cure igieniche 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) X Spasticità o flaccidità per (specificare) X Debolezza muscolare per (specificare) X Paralisi per (specificare) X Atrofia per (specificare) X Contratture muscolari per (specificare) X Stato comatoso X Disturbi visivi X Arti non funzionanti o mancanti X Regressione a un precedente stadio di sviluppo X Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) X Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale X Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	

Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	
Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> usare il telefono <input checked="" type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input checked="" type="checkbox"/> lavare e stirare <input checked="" type="checkbox"/> preparare i pasti <input checked="" type="checkbox"/> fare la spesa <input checked="" type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare)	

<ul style="list-style-type: none"> X Stato comatoso X Disturbi visivi X Arti non funzionanti o mancanti X Regressione a un precedente stadio di sviluppo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) X Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale X Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare
--

Deambulazione, compromissione, rischio	X
Vedere mobilità, compromissione, rischio	

Deglutizione, compromissione	X
-------------------------------------	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) X Tumore / edema tracheo-esofageo X Irritazione della cavità orofaringea X Diminuzione della salivazione <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica X Esofagite da radioterapia <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione del livello di coscienza X Fatigue <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto
--

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
---	----------

<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) X Cancro X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
--

- X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- X Effetti di un tumore su addome, torace, ossa, ecc.
- X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali

Trattamenti

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- X Iperattività
- X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- X Risposta allergica
- X Ansia grave e repressa

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- X Cancro
- X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- X Effetti di un tumore su (specificare)
- X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali

Trattamenti

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- X Iperattività
- X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- X Risposta allergica
- X Ansia grave e repressa

Eliminazione urinaria compromessa	X
Per Incontinenza urinaria (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) <input checked="" type="checkbox"/> Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) <input checked="" type="checkbox"/> Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) <input checked="" type="checkbox"/> Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) <input checked="" type="checkbox"/> Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)	
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)	
Eminegligenza	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Alterazione delle capacità percettive secondaria ictus cerebrale, tumore cerebrale, lesione/trauma cranico, aneurisma cerebrale	
Fatigue	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza) <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) <input checked="" type="checkbox"/> Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla, SLA, M. Parkinson, AIDS) <input checked="" type="checkbox"/> Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore <input checked="" type="checkbox"/> Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito) <input checked="" type="checkbox"/> Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)	
Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia, <input checked="" type="checkbox"/> Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle)	
Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità) <input checked="" type="checkbox"/> Stress emotivo <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi del sonno	

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento Trattamenti X Variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico) Situazionali (personali, ambientali) X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità	
Immobilizzazione, sindrome da	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Riduzione del sensorio X Stato di incoscienza X Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale) X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche) X Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia) X Cancro X Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi) Trattamenti X Intervento chirurgico X Linee venose X Trazione/gesso/tutore ortopedico X Immobilità prescritta Situazionali (personali, ambientali) X Depressione X Fatigue X Stato di debilitazione X Dolore Fasi di sviluppo X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile	
Incontinenza fecale	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica) X Compromissione delle funzioni cognitive X Iperdistensione rettale per stipsi cronica X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla) Trattamenti X Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni. Situazionali (personali, ambientali) X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)	

Incontinenza urinaria da sforzo	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Anomalie congenite delle vie urinarie X Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, inadeguata igiene personale Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdita di tono muscolare 	
Incontinenza urinaria da urgenza	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale, X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi X Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: diminuita capacità vescicale 	
Incontinenza urinaria funzionale	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della mobilità X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare) Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Anomalie congenite delle vie urinarie X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva X Strumentazione diagnostica X Riduzione del tono muscolare per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della mobilità X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	
Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità X Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato, pieghe cutanee) X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per x minuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica 	

Insonnia	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica) X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria) X Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) X Eccessivo dormire di giorno X Depressione X Inadeguata attività fisica durante il giorno X Dolore cronico X Risposte ansiose X Modifiche ambientali (specificare) X Paura X Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa) 	
Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia, . 	
Integrità mucosa orale, compromissione	X
Fattori correlati <ul style="list-style-type: none"> X Inadeguata igiene orale X Incapacità di provvedere all'igiene orale 	
Ipertermia	X
Fattori correlati Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco) Situazionali <ul style="list-style-type: none"> X Abbigliamento inadeguato al clima X Diminuzione della circolazione (per persona x sovrappeso/sottopeso, disidratazione) X Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età 	

Ipotermia **X**

Fattori correlati

Situazionali (personali, ambientali)

- X Esposizione a freddo, pioggia, neve, vento
- X Vestiario inadatto al clima
- X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività)

Fasi di sviluppo

- X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano)

Lesione, rischio di **X**

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)
- X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)
- X Fatigue
- X Ipotensione ortostatica
- X Insufficienza vertebro basilare
- X Disturbi vestibolari
- X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)
- X Movimenti tonico-clonici (convulsioni)

Trattamenti

- X Lungo allettamento
- X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)
- X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione o perdita memoria a breve termine
- X Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
- X Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- X Scarpe inadatte,
- X Disattenzione del caregiver
- X Uso improprio degli ausili
- X Storia di incidenti
- X Andatura instabile

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

Liquidi, eccessivo volume di **X**

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
- X Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite)
- X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

<p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea) X Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Eccessivo apporto di sodio/liquidi X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione) X Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

Liquidi, insufficiente volume di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato) X Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Vomito/nausea X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue) X Dieta scorretta/digiuno X Nutrizione per sonda con soluzione concentrata X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue) X Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi) X Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche X Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete 	

Memoria, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico) X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento) X Deficienze nutrizionali <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione) X Consumo di alcol X Mancanza di motivazione X Inadeguata stimolazione X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni) 	

Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale) X Riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache) X Rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco) X Edemi X Apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso) X Forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X fatigue X obesità X mancanza di motivazione X dispnea X dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare 	
Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
Nausea	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, malessere da movimento, stress) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti della chemioterapia e/o farmaci 	
Non adesione a indicazioni terapeutiche	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi) X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti collaterali della terapia X Ambiente non terapeutico X Terapia complessa non controllata/prolungata X Costo economico della terapia X Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace X Processo di presa in carico impersonale (multi professionale) 	

Situazionali (personali, ambientali)

- X Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente)
- X Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)
- X Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio
- X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di
X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)
- X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)
- X Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)
- X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)
- X Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia
- X Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)
- X Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- X Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- X Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- X Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- X Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- X Inappetenza per reflusso gastroesofageo

Trattamenti

- X Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)
- X Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)
- X Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- X Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- X Diarrea

Fasi di sviluppo

- X Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)

Nutrizione superiore al fabbisogno	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Alterato modello di sazietà (specificare) X Riduzione dei sensi di gusto/olfatto Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Deficit di conoscenze delle basi nutrizionali Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico 	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia) X Soppressione del riflesso della tosse X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia) X Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo) 	
Soffocamento, rischio Vedere rischio di lesione	X
Stipsi	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza) X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo) X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore) X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale) X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare X Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile X Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Effetti collaterali di farmaci (analgesici oppioidi) X Effetti sulla peristalsi dell'anestesia e della manipolazione chirurgica 	



<ul style="list-style-type: none"> X Uso abituale di lassativi X Mucosite secondaria a radiazioni <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) X Modello di evacuazione irregolare X Credenze culturali/sulla salute X Mancanza di riservatezza X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata X Paura di dolore rettale o cardiaco X Valutazioni errate X Incapacità di percepire i segnali intestinali
--

Stress, sovraccarico psicofisico	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare) X Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra X Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia) X Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali X Perdite funzionali 	

Trasferimento, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
--	----------

Trauma, rischio Vedere rischio di lesione	X
--	----------

<p>Altre Diagnosi Infermieristiche <u>prevalentemente</u> trattate Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)</p>
AFFATICAMENTO
INTOLLERANZA ALLE ATTIVITA'
AUTOLESIONISMO, RISCHIO DI
SUICIDIO, RISCHIO DI
ALTERAZIONE DEL COMFORT
COMPROMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE

Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI
 Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A.
 Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per embolia polmonare	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
RC per atelectasia/polmonite	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per bilancio azotato negativo	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rc per trombocitopenia	X
RC per infezioni opportunistiche	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per crisi convulsiva	X
RC per astinenza da alcol	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
RC per disfunzione epatica	X
RC per iperbilirubinemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica	
RC per fratture patologiche	X
RC per lussazione	X



Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antineoplastici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.

Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Modello organizzativo

Il modello organizzativo del reparto è quello per piccole équipe

Interventi assistenziali infermieristici:

- Assistenza alla persona sottoposta a ventilazione assistita CPAP
- Collaborazione con il medico per il posizionamento di CVC ed applicazione della procedura aziendale per la gestione di tutti i tipi di CVC
- Collaborazione con il medico per il posizionamento di CVP eco guidate e di midline
- Preparazione ed assistenza della persona prima, durante e dopo l'esecuzione di esami diagnostici e trattamenti terapeutici invasivi quali: paracentesi, toracentesi, biopsia osteo-midollare
- Applicazione di protocolli per l'isolamento (aereo, contatto, droplet)
- Educazione terapeutica alle persone assistite e ai caregiver (training insulina, gestione ossigeno terapia, gestione PEG, gestione CV)