

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome EMANUELE Cognome PALERMO Telefono REPARTO: 011/240 2292 o 2920 CELLULARE PERSONALE: 3496261459 e-mail emanuele.palermo@unito.it</p>
<p>Struttura/servizio</p> <p>Nominativo, ubicazione, ecc</p> <p>N°locali, n° posti letto,</p> <p>Orari apertura al pubblico,</p> <p>Orari di lavoro,</p> <p>Figure professionali</p>	<p>SC Neurochirurgia</p> <p>10/12 posti letto di specialità Neurochirurgica attualmente accorpati alla SC di Neurologia 2 (Degenza e Stroke Unit). La SC di Neurologia 2 dispone di 9 camere di degenza (per un totale di 28 posti letto), infermeria, ufficio coordinatore infermieristico, studi medici, segreteria e sala di attesa, tisaneria, locale magazzino, locale smaltimento rifiuti, servizi igienici per degenti e per il personale di reparto.</p> <p>Ingresso consentito 1 ora al giorno (salvo eccezioni del caso) su due turni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H 16.30 - 17.30 - H 17.30 – 18.30 <p>Al momento del ricovero vengono informati i familiari della fascia oraria assegnata</p> <p>Gli orari di servizio sono articolati in 3 fasce di turni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mattino 07.00-14.47 - pomeriggio 14.30-22.30 - notte 22.15-07.15 <p>1 coordinatore infermieristico 19 infermieri 16 OSS 2 direttore di struttura complessa (1 di neurochirurgia e 1 di neurologia) 6 neurochirurghi e 9 neurologi 1 segretaria</p>

Risorse strumentali	Monitor multiparametrici Pompe infusionali per la terapia endovenosa ed enterale Materassi antidecubito Set di Becker per il drenaggio liquorale Solleva malati Elettrocardiografo Computer per la terapia informatizzata e per la cartella clinica integrata Carrello urgenze con defibrillatore Ecografo
Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	Accesso internet Protocolli e procedure di reparto e aziendali Mensa
Contatti e riferimenti	Indirizzo P.za Donatori di Sangue 3 Telefono 011-2402292 Fax 011-2402214 e-mail
Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici	Pullman: 2, 27 e 75 Tram: 4 Treno: SFM1 , SFM4 (Stazione Torino Rebaudengo)

Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Cerebrovascolari	X

Patologie del Rachide	X

Idrocefalo	X

Malattie Oncologiche	X

Malattie Traumatologiche / incidenti	X

Allegato 2
Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...) X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) Fasi di sviluppo X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento	

Aspirazione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia) X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè) X Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia) Trattamenti X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale) X Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona) Fasi di sviluppo X Persona anziana: dentizione inadeguata	

Attività, intolleranza all'attività	X
Fattori correlati Fisiopatologici Aumento del fabbisogno metabolico per X Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche) Trattamenti X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto) Situazionali (personali, ambientali) X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria) X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione,	

obesità, dolore, dispnea) Fasi di sviluppo X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali

Autostima, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) X Squilibri biochimici, neurofisiologici Situazionali (personali, ambientali) X Bisogno di dipendenza non soddisfatto	

Cadute, rischio	X
Vedere lesione, rischio	

Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità) Trattamenti X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)	

Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio X Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale. X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer) X Paralisi delle corde vocali, tetraplegia X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria) Trattamenti X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)	



Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità o perdita di funzioni 	
Confusione mentale acuta	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fattori di rischio</p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia) X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite) X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano) X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidi, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale) X Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Dolore, fecaloma, immobilità 	
Coping inefficace	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale) X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione) X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale) 	



Cura di sé, deficit (alimentazione)	X
Incapacità di (specificare):	
<input checked="" type="checkbox"/> tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni	
<input checked="" type="checkbox"/> portare il cibo alla bocca	
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso	
<input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi	
<input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale	
Fasi di sviluppo	
<input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)	X
Ridotta e/o incapacità di (specificare):	
<input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti	
<input checked="" type="checkbox"/> procurarsi l'acqua	
<input checked="" type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua	
<input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	
Fattori correlati	
Fisiopatologici	
<input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare)	
<input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso	
<input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi	
<input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti	
Trattamenti	
<input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori	
Situazionali (personali, ambientali)	
<input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi	
<input checked="" type="checkbox"/> Dolore	
<input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale	

<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale</p>	
<p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</p>	X
<p>Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale</p>	
<p>Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio</p>	X



Deglutizione, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici) X Tumore / edema tracheo-esofageo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione del livello di coscienza X Fatigue 	
Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) X Cancro X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomètria invasiva) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità/posizionamento inappropriato 	
Eliminazione urinaria compromessa	X
<p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) X Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Anomalie congenite delle vie urinarie X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva) 	

Eminegligenza	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Alterazione delle capacità percettive secondaria ictus cerebrale, tumore cerebrale, lesione/trauma cranico, aneurisma cerebrale	
Fatigue	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS) Trattamenti X Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia	
Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento Trattamenti X Variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico)	
Immobilizzazione, sindrome da	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Riduzione del sensorio X Stato di incoscienza X Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale) X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche) X Cancro Trattamenti X Intervento chirurgico	
Incontinenza fecale	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica) X Compromissione delle funzioni cognitive X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla) Situazionali (personali, ambientali) X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)	

Infezione, rischio di	X
Fattori correlati Trattamenti X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale Situazionali (personali, ambientali) X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) Fasi di sviluppo X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)	
Insomnia	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) X Modifiche ambientali (specificare)	
Integrità mucosa orale, compromissione	X
Fattori correlati X Inadeguata igiene orale X Incapacità di provvedere all'igiene orale	
Lesione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope) X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito) X Ipotensione ortostatica X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) Trattamenti X Lungo allettamento Situazionali (personali, ambientali) X Andatura instabile	
Memoria, compromissione	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico)	



Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale) 	
Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari) X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) 	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Soppressione del riflesso della tosse X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) 	
Stipsi	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata X Incapacità di percepire i segnali intestinali 	

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PREVALENTEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse

(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per ipertensione endocranica	X
RC per crisi convulsiva	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica	
RC per fratture patologiche	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticonvulsivanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X



Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Il modello organizzativo in uso è quello delle mini équipes, con riunioni multidisciplinari settimanali.

Nel servizio è frequentemente necessario condurre interventi educativi per le seguenti problematiche e tipologie di assistiti:

- con problematiche epilettiche;
- in terapia anticoagulante;
- con disfagia;
- portatori di tracheostomia;
- con deficit motori e cognitivi;
- che presentano incontinenza e/o ritenzione urinaria;
- con drenaggi liquorali e/o ematici.

Infatti vengono progettati e realizzati i seguenti interventi educativi:

- educazione della persona e del care giver all'assunzione del pasto per chi presenta problemi di disfagia e/o è portatore di tracheostomia;
- educazione della persona e del care giver alla mobilizzazione per chi presenta deficit motori;
- educazione della persona e del care giver all'autocateterismo;
- educazione della persona e del care giver alla mobilizzazione per chi è portatore di drenaggi liquorali e/o ematici.

In questo servizio si eseguono particolari esami diagnostici e trattamenti invasivi e non che richiedono una specifica attenzione, quali:

- angiografie e/o embolizzazioni per via angiografica;
- TAC e RMN con mezzo di contrasto e non;
- punture lombari diagnostiche e terapeutiche;
- posizionamento di cateteri venosi centrali, P.E.G., tracheostomie;
- trasfusioni di emocomponenti;



- posizionamento di derivazioni liquorali;
- interventi neurochirurgici;
- esami batteriologici (emocolture, urocolture, colturale su broncoaspirato e liquor).

Esistono inoltre diversi protocolli aziendali in uso nel servizio:

- Assistenza al paziente nella fase perioperatoria;
- Assistenza perioperatoria al paziente operato di adenoma ipofisario;
- Medicazione della ferita chirurgica
- Gestione del catetere vescicale;
- Gestione del catetere venoso centrale;
- Gestione della cannula tracheostomica;
- Preparazione e posizionamento PEG;
- Esecuzione di esami batteriologici;
- Il buon uso del sangue;
- Gestione delle urgenze/emergenze
- Trasferimento e dimissione delle persone assistite
- Gestione dell'isolamento e delle infezioni nosocomiali
- Gestione del paziente diabetico
- Gestione delle lesioni da pressione
- Attività di badanza e visite parenti
- Attivazione della reperibilità
- Gestione del percorso diagnostico-terapeutico del paziente vittima di trauma
- Richiesta della teca cranica dalla banca dell'osso
- Trapianto di cellule staminali mesenchimali
- Trattamento delle crisi epilettiche e dello stato di male epilettico
- Donazione organi e tessuti