

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

| Contesto | |
|---|--|
| <p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p> | <p>GIULIA BIONDINO 0114393065 giulia.biondino@unito.it</p> |
| <p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p> | <p>O.B.I. (Osservazione Breve Intensiva) Servizio afferente al pronto soccorso di circa 20 posti letto. La struttura si trova al padiglione F, primo piano. Entrata principale o entrata dal pronto soccorso.</p> <p><i>Mattino (07-15)</i> <i>Pomeriggio (15-22)</i> <i>Notte (22-07)</i></p> <p>All'interno del reparto è possibile la collaborazione con molteplici figure in base alla necessità dei pazienti. Una di queste è il personale medico/chirurgico ed il bed manager.</p> <p><u>PC per ricerche</u> (SI) <u>Spazio riservato per studenti</u> (SI) <u>Mensa</u> (SI, possibilità di utilizzare la cucina in turni)</p> |

Allegato 1
Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Dipendenze patologiche X

- Dipendenza da Alcol e sostanze stupefacenti

Malattie Cardiovascolari X

- Scompenso Cardiaco
- Aritmie
- Patologie ischemiche

Malattie Cerebrovascolari X

- Ictus (emorragico e ischemico)
- Emorragia subaracnoidea post traumatica
- Vasculopatie croniche

Malattie Endocrinologiche, metaboliche X

- Diabete mellito
- Patologie tiroidee
- Lesioni vascolari e da pressione
- Squilibri elettrolitici

Malattie Intestinali / digestive X

- Occlusione intestinale
- Infiammazioni croniche dell'apparato digestivo

Malattie Infettive X

- Infezioni nosocomiali da contatto
- Malattie endemiche e MTS (malattie sessualmente trasmissibili)

| | |
|---|--------------------------|
| Malattie Nefrologiche, genito/urinarie | X |
| <ul style="list-style-type: none"> - Infezione delle vie urinarie - Ritenzione urinaria - Idronefrosi e pielonefriti - Insufficienza renale (acuta e cronica) | |
| Malattie Onco-ematologiche | <input type="checkbox"/> |
| <ul style="list-style-type: none"> - Anemia acuta e cronica - Patologie oncologiche | |
| Malattie Respiratorie | X |
| <ul style="list-style-type: none"> - BPCO - Asma - Polmonite - Edema Polmonare Acuta - Insufficienza respiratoria | |
| Malattie Traumatologiche / incidenti | X |
| <ul style="list-style-type: none"> - Fratture di femore - Fratture dell'anziano - Trauma cranico | |
| Salute Mentale | X |
| <ul style="list-style-type: none"> - Disturbi psichiatrici compensati (Depressione, Schizofrenia, Disturbo borderline ecc) | |
| Altro (specificare) | X |
| <ul style="list-style-type: none"> - Paziente chirurgico (esempio: colecistiti, Pancreatiti) | |

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 6th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)

| Ansia | X |
|---|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p><input type="checkbox"/> Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p><input type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p><input type="checkbox"/> Perdita reale o percepita di persone significative</p> <p><input type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p> <p><input type="checkbox"/> Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)</p> <p><input type="checkbox"/> Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p><input type="checkbox"/> Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei</p> <p><input type="checkbox"/> Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio</p> <p><input type="checkbox"/> Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</p> | |

| Aspirazione, rischio di | X |
|---|----------|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia) <input type="checkbox"/> Depressione dei riflessi della tosse/faringeo <input type="checkbox"/> Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo) <input type="checkbox"/> Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina) <input type="checkbox"/> Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per acalasia, condizioni debilitanti, miastenia grave, catatonìa, Mdi Parkinson, stenosi esofagea, ictus cerebrale, sclerosi multipla, sclerodermia, distrofia muscolare, sindrome di Guillain Barrè) <input type="checkbox"/> Fistola tracheo-esofagea <input type="checkbox"/> Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale) <input type="checkbox"/> Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo <input type="checkbox"/> Assunzione di alimenti in corso di intossicazione <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persona anziana: dentizione inadeguata | |
| Attività, intolleranza all'attività | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina) <input type="checkbox"/> Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispasia broncopolmonare) <input type="checkbox"/> Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica) <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici) <input type="checkbox"/> Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche) <input type="checkbox"/> Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) <input type="checkbox"/> Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza) <input type="checkbox"/> Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria) <input type="checkbox"/> Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali | |

| | |
|---|----------|
| Cadute, rischio Vedere lesione, rischio | X |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver <input type="checkbox"/> Modello di coping inefficace <input type="checkbox"/> Salute fisica compromessa <input type="checkbox"/> Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari <input type="checkbox"/> Durata dell'assistenza richiesta <input type="checkbox"/> Isolamento <input type="checkbox"/> Pause di riposo/svago insufficienti o <input type="checkbox"/> Risorse economiche insufficienti <input type="checkbox"/> Assenza o non disponibilità di sostegno <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (specificare) o disabilità fisiche (specificare) | |

| | |
|--|----------|
| Casa, compromessa gestione | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze. <input type="checkbox"/> Mancata disponibilità di un sistema di sostegno <input type="checkbox"/> Perdita di un familiare <input type="checkbox"/> Deficit di conoscenze <input type="checkbox"/> Insufficienza di risorse economiche <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali) | |



**Comunicazione, compromissione e
Comunicazione verbale, compromissione**

X

(incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia
- Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio
- Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale.
- Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer)
- Paralisi delle corde vocali, tetraplegia
- Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per compromissione respiratoria, dispnea, edema, infezione della laringe, deformità del cavo orale, labio/palatoschisi, mal occlusione o frattura mascellare, adentulia, disartria)

Trattamenti

- Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)

Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)
- Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento
- Barriere psicologiche (paura, timidezza)
- Mancanza di riservatezza
- Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)

Fasi di sviluppo

- Persona anziana (perdite uditive)
- Compromissione cognitiva per (specificare patologia)



Confusione mentale acuta



Fattori correlati

Fattori di rischio

Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per

- Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)
- Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)
- Disturbi cardiovascolari (infarto miocardico, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale) ematoma subdurale)
- Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)
- Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)
- Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo, disfunzione ipofisaria, disturbi paratiroidei, del corticosurrene, ipotensione posturale, insufficienza epatica o renale)
- Disordini del SNC (ictus cerebrale, idrocefalo normoteso, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)

Trattamenti

- Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- Disturbo del metabolismo cerebrale per astinebza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.
- Dolore, fecaloma, immobilità,
- Depressione, situazioni non familiari
- Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)



Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Presenza di batteri, virus, tossine
- Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)
- Stati patologici pre-esistenti
- Genere
- Storia di fumo

Trattamenti

- Vaccinazioni recenti
- Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione
- Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati

Situazionali (personali, ambientali)

- Alluvioni, terremoti, disastri naturali.
- Perdite rete fognaria
- Emissioni da impianti industriali:scarichi intenzionali o accidentali di contaminanti da locali commerciali o industriali, inquinamento delle falde acquifere
- Fattori fisici:condizioni climatiche, area geografica
- Fattori sociali: sovraffollamento carenza servizi igienici, povertà, inadeguate pratiche di igiene personale o della casa, mancato accesso all'assistenza sanitaria
- Fattori biologici: presenza di vettori (zanzare, zecche, roditori)
- Bioterrorismo
- Tipo di lavoro
- Pratiche dietetiche
- Contaminazione accidentale o intenzionale di riserve alimentari o idriche
- Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni

Fasi di sviluppo

- Persone anziane
- Età gestazionale durante l'esposizione



| | |
|---|----------|
| <p>Cura di sé, deficit (alimentazione) Incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni <input type="checkbox"/> portare il cibo alla bocca | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare | |



| | |
|---|---|
| <p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare | |



| | |
|---|---|
| <p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare | |

| | |
|---|---|
| <p>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatici <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare | |



| | |
|--|---|
| <p>Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> usare il telefono <input type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input type="checkbox"/> lavare e stirare <input type="checkbox"/> preparare i pasti <input type="checkbox"/> fare la spesa <input type="checkbox"/> gestire il denaro <input type="checkbox"/> assumere i farmaci | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità per (specificare) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input type="checkbox"/> Stato comatoso <input type="checkbox"/> Disturbi visivi <input type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <input type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input type="checkbox"/> Deficit somatiformi <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input type="checkbox"/> Dolore <input type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input type="checkbox"/> Affaticamento <input type="checkbox"/> Confusione mentale <input type="checkbox"/> Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare | |
| <p>Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio</p> | X |



Deglutizione, compromissione



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, botulismo, M. di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, distrofia muscolare, S. di Guillain Barrè, poliomielite, SLA, ictus cerebrale, danno nervi cranici)
- Tumore / edema tracheo-esofageo
- Irritazione della cavità orofaringea
- Diminuzione della salivazione

Trattamenti

- Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso
- Riduzione della coscienza per anestesia
- Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica
- Esofagite da radioterapia

Situazionali (personali, ambientali)

- Alterazione del livello di coscienza
- Fatigue

Fasi di sviluppo

- Bambino: diminuzione della sensibilità e difficoltà di masticazione, scarsa coordinazione tra suzione/deglutizione/respirazione
- Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto



Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)



Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- Cancro
- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

Trattamenti

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomètria invasiva)
- Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- Febbre
- Immobilità/posizionamento inappropriato
- Iperattività
- Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti)
- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa

Fasi di sviluppo

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- 1 anno: coliche
- Prima infanzia: dentizione, otalgia
- Media infanzia: dolore addominale ricorrente, dolori della crescita
- Adolescenza: cefalea, dolore toracico, dismenorrea.



Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)
- Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- Cancro
- Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.
- Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)
- Effetti di un tumore su (specificare)
- Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.
- Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali
- Dolori durante il travaglio / parto, ingorgo mammario

Trattamenti

- Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva)
- Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

Situazionali (personali, ambientali)

- Febbre
- Immobilità/posizionamento inappropriato
- Iperattività
- Punti di pressione (es. ingessatura o bendaggio stretti)
- Risposta allergica
- Irritanti chimici
- Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- Ansia grave e repressa

| | |
|---|----------|
| Eliminazione urinaria compromessa Per Incontinenza urinaria (specificare): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) <input type="checkbox"/> Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) <input type="checkbox"/> Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) <input type="checkbox"/> Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) <input type="checkbox"/> Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) <input type="checkbox"/> Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie <input type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) <input type="checkbox"/> Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva) | |

| | |
|---|----------|
| Fatigue | X |
| Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre, gravidanza) <input type="checkbox"/> Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) <input type="checkbox"/> Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) <input type="checkbox"/> Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS) <input type="checkbox"/> Stato ipermetabolico, competizione tra organismo e neoplasia per i nutrienti, anemia fattori di stress associati a tumore <input type="checkbox"/> Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, intervento chirurgico allo stomaco, diabete mellito) <input type="checkbox"/> Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, Lupus eritematoso, epatite, Cirrosi Epatica, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Modificazioni biochimiche secondarie a chemioterapia, radioterapia, effetti collaterali di (specificare) danni tissutali da intervento chirurgico e anestesia, <input type="checkbox"/> Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità) <input type="checkbox"/> Eccessive richieste di ruolo <input type="checkbox"/> Richieste emozionali soverchianti <input type="checkbox"/> Stress emotivo <input type="checkbox"/> Disturbi del sonno | |

| Immobilizzazione, sindrome da | X |
|---|----------|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riduzione del sensorio <input type="checkbox"/> Stato di incoscienza <input type="checkbox"/> Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, distrofia muscolare, sindrome di Guillain-Barrè, parkinsonismo, lesione del midollo spinale) <input type="checkbox"/> Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche) <input type="checkbox"/> Malattia terminale (AIDS, cardiopatia, nefropatia) <input type="checkbox"/> Cancro <p>Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Intervento chirurgico <input type="checkbox"/> Ventilazione meccanica <input type="checkbox"/> Linee venose <input type="checkbox"/> Trazione/gesso/tutore ortopedico <input type="checkbox"/> Immobilità prescritta <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Depressione <input type="checkbox"/> Fatigue <input type="checkbox"/> Stato di debilitazione <input type="checkbox"/> Dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida <input type="checkbox"/> Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile | |

| Incontinenza fecale | X |
|---|----------|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione dello sfintere rettale (per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica) <input type="checkbox"/> Compromissione delle funzioni cognitive <input type="checkbox"/> Iperdistensione rettale per stipsi cronica <input type="checkbox"/> Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla) <input type="checkbox"/> Trattamenti <input type="checkbox"/> Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni. <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive) | |

| | |
|--|---|
| Incontinenza urinaria da sforzo | X |
|--|---|

| |
|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Anomalie congenite delle vie urinarie <input type="checkbox"/> Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale <input type="checkbox"/> Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persona anziana: perdita di tono muscolare |
|---|

| | |
|---|---|
| Incontinenza urinaria da urgenza | X |
|---|---|

| |
|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale, <input type="checkbox"/> Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi <input type="checkbox"/> Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino: limitata capacità vescicale <input type="checkbox"/> Persona anziana: diminuita capacità vescicale |
|---|

| | |
|---|---|
| Incontinenza urinaria funzionale | X |
|---|---|

| |
|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione della mobilità <input type="checkbox"/> Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <input type="checkbox"/> Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persona anziana: perdite motorie/sensitive |
|---|



Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)



Fattori correlati

Fisiopatologici

- Anomalie congenite delle vie urinarie
- Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria
- Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla

Trattamenti

- Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva
- Strumentazione diagnostica
- Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorellassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)

Situazionali (personali, ambientali)

- Compromissione della mobilità
- Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)

Fasi di sviluppo

- Persona anziana: perdite motorie/sensitive

| Infezione, rischio di | X |
|--|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) <input type="checkbox"/> Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale <input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità <input type="checkbox"/> Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio) <input type="checkbox"/> gessato, pieghe cutanee) <input type="checkbox"/> Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Neonato: maggiore vulnerabilità del neonato per madre HIV positiva, carenza di anticorpi materni, flora normale insufficiente, ferite aperte (ombelicale, circoncisione), sistema immunitario immaturo <input type="checkbox"/> Bambino-adolescente: maggiore vulnerabilità per perdita dell'immunizzazione, molteplici partner sessuali <input type="checkbox"/> Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) | |

| Insonnia | X |
|--|---|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica) <input type="checkbox"/> Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria) <input type="checkbox"/> Compromissione del metabolismo (per ipertiroidismo, disturbi epatici, ulcera gastrica) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) <input type="checkbox"/> Eccessivo dormire di giorno <input type="checkbox"/> Depressione <input type="checkbox"/> Inadeguata attività fisica durante il giorno <input type="checkbox"/> Dolore cronico <input type="checkbox"/> Risposte ansiose <input type="checkbox"/> Modifiche ambientali (specificare) <input type="checkbox"/> Paura <input type="checkbox"/> Frequenti risvegli dei bambini <input type="checkbox"/> Donna adulta: variazioni ormonali (es. Perimenopausa) | |

| | |
|---|----------|
| Integrità cutanea/tissutale: compromissione, rischio | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Infiammazioni delle giunzioni dermo-epidermiche (per lupus eritematoso, sclerodermia,. | |
| Integrità mucosa orale, compromissione | X |
| <p>Fattori correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inadeguata igiene orale <input type="checkbox"/> Incapacità di provvedere all'igiene orale | |
| Ipertermia | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ridotta capacità di sudorazione (specificare il farmaco) <p>Situazionali</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Esposizione al calore, al sole <input type="checkbox"/> Abbigliamento inadeguato al clima <input type="checkbox"/> Assenza di condizionamento dell'aria <input type="checkbox"/> Strumenti per il riscaldamento del neonato in ambito ospedaliero <input type="checkbox"/> Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione) <input type="checkbox"/> Idratazione insufficiente per un'attività fisica vigorosa <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età | |
| Liquidi, eccessivo volume di | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema) <input type="checkbox"/> Iperensione portale, diminuzione della pressione colloidale-osmotica e ritenzione di sodio (per epatopatia, cancro, cirrosi, ascite) <input type="checkbox"/> Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica, Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidica) <input type="checkbox"/> Inadeguato drenaggio linfatico (mastectomia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eccessivo apporto di sodio/liquidi <input type="checkbox"/> Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione) <input type="checkbox"/> Ristagno venoso declive/venostasi (per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta) <input type="checkbox"/> Compromissione venosa da utero gravido <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare | |

| Liquidi, insufficiente volume di | X |
|--|----------|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato) <input type="checkbox"/> Aumento della permeabilità capillare e evaporazione da ustioni <input type="checkbox"/> Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, emorragia) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Vomito/nausea <input type="checkbox"/> Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue) <input type="checkbox"/> Dieta scorretta/digiuno <input type="checkbox"/> Nutrizione per sonda con soluzione concentrata <input type="checkbox"/> Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue) <input type="checkbox"/> Esposizione a climi estremi <input type="checkbox"/> Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi) <input type="checkbox"/> Liquidi insufficienti in rapporto all'esercizio fisico/condizioni climatiche <input type="checkbox"/> Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino: aumentata vulnerabilità (ridotta riserva idrica, ridotta capacità di concentrazione delle urine) <input type="checkbox"/> Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete | |

| Memoria, compromissione | X |
|--|----------|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico) <input type="checkbox"/> Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento) <input type="checkbox"/> Deficienze nutrizionali <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aspettative che si auto realizzano <input type="checkbox"/> Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione) <input type="checkbox"/> Consumo di alcol <input type="checkbox"/> Mancanza di motivazione <input type="checkbox"/> Inadeguata stimolazione <input type="checkbox"/> Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni) | |



| Mobilità, compromissione /rischio di | X |
|---|----------|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale) <input type="checkbox"/> riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache) <input type="checkbox"/> rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica articolare, malattia degenerativa delle articolazioni e del disco) <input type="checkbox"/> edemi <input type="checkbox"/> apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso) <input type="checkbox"/> forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> fatigue <input type="checkbox"/> obesità <input type="checkbox"/> mancanza di motivazione <input type="checkbox"/> dispnea <input type="checkbox"/> dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Bambino: alterazione dell'andatura per deficienze scheletriche congenite, displasia congenita dell'anca, osteomielite <input type="checkbox"/> Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare | |
| Nausea | X |
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Effetti della chemioterapia e/o farmaci <input type="checkbox"/> Effetti dell'anestesia | |



Non adesione (a indicazioni terapeutiche)

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)
- Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato

Trattamenti

- Effetti collaterali della terapia
- Ambiente non terapeutico
- Terapia complessa non controllata/prolungata
- Costo economico della terapia
- Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace
- Processo di presa in carico impersonale (multi professionale)

Situazionali (personali, ambientali)

- Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente)
- Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità)
- Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio
- Modificazione dello stato lavorativo
- Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie
- Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- Aumentato fabbisogno calorico e difficoltà ad assumere sufficienti calorie (per ustione, trauma, complicanze/deformazioni gastrointestinali, cancro, alcolismo, uso di sostanze stupefacenti, infezione, AIDS)
- Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)
- Diminuito assorbimento di nutrienti (per M.di Crohn, enterocolite necrotizzante, intolleranza al lattosio, fibrosi cistica)
- Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)
- Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia
- Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)
- Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)
- Inappetenza e diarrea (per infezione da protozoi)
- Vomito, inappetenza e alterazioni della digestione (per pancreatite)
- Inappetenza e compromissione del metabolismo proteico/lipidico, ipovitaminosi (per cirrosi epatica)
- Inappetenza, vomito e alterazione della digestione (per malformazioni del tratto gastrointestinale /enterocolite necrotizzante)
- Inappetenza per reflusso gastroesofageo

Trattamenti

- Aumentato fabbisogno proteico/vitaminico per la cicatrizzazione di ferite e diminuita assunzione (per intervento chirurgico, farmaci, blocco mandibolare, radioterapia)
- Inadeguato assorbimento come effetto collaterale di farmaci (specificare)
- Diminuita assunzione orale, dolore in sede orale, nausea, vomito (per radioterapia, chemioterapia, tonsillectomia)

Situazionali (personali, ambientali)

- Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)
- Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)
- Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)
- Diarrea

Fasi di sviluppo

- Neonato/bambino: inadeguata assunzione (per carente stimolazione sensoriale, inadeguate conoscenze del care giver, scarsa produzione del latte materno)
- Malassorbimento, restrizioni dietetiche, inappetenza (per morbo celiaco, fibrosi cistica, intolleranza al lattosio, malformazioni gastrointestinali, reflusso gastroesofageo, enterocolite necrotizzante)
- Difficoltà di suzione/disfagia (per paralisi, labioschisi, palatoschisi)
- Inadeguata suzione, astenia e dispnea (per cardiopatia congenita, iperbilirubinemia, sindrome virale, distress respiratorio, prematurità, ritardo di sviluppo)

| Respirazione, inefficace funzionalità, rischio | X |
|--|----------|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) <input type="checkbox"/> Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia) <input type="checkbox"/> Soppressione del riflesso della tosse <input type="checkbox"/> Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia) <input type="checkbox"/> Livello di umidità estremamente alto/basso (posizione prona nel sonno, esposizione a freddo, pianto, riso, allergeni, fumo) | |

| Stipsi | X |
|---|----------|
| <p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, spina bifida, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza) <input type="checkbox"/> Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, feocromocitoma, uremia, neuropatia diabetica, ipo pituitarismo) <input type="checkbox"/> Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore) <input type="checkbox"/> Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale) <input type="checkbox"/> Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare <input type="checkbox"/> Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile <input type="checkbox"/> Incapacità di rilassare lo sfintere anale e elevata pressione a riposo nel canale anale (parti vaginali multipli, sforzo cronico) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Effetti collaterali di farmaci (specificare) <input type="checkbox"/> Effetti sulla peristalsi dell'anaestesia e della manipolazione chirurgica <input type="checkbox"/> Uso abituale di lassativi <input type="checkbox"/> Mucosite secondaria a radiazioni <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) <input type="checkbox"/> Modello di evacuazione irregolare <input type="checkbox"/> Credenze culturali/sulla salute <input type="checkbox"/> Mancanza di riservatezza <input type="checkbox"/> Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata <input type="checkbox"/> Paura di dolore rettale o cardiaco <input type="checkbox"/> Valutazioni errate <input type="checkbox"/> Incapacità di percepire i segnali intestinali | |

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI

 Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse
 (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)

| | |
|--|---|
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare | |
| RC per riduzione della gittata cardiaca | X |
| RC per aritmie | X |
| RC per edema polmonare | X |
| RC per trombosi venosa profonda | X |
| RC per embolia polmonare | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria | |
| RC per ipossiemia | X |
| RC per atelectasia/polmonite | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica | |
| RC per ipo/iperglicemia | X |
| RC per squilibri elettrolitici | X |
| RC per sepsi | X |
| RC per acidosi (metabolica, respiratoria) | X |
| RC per alcalosi (metabolica, respiratoria) | X |
| RC per infezioni opportunistiche | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria | |
| RC per ritenzione urinaria acuta | X |
| RC per insufficienza renale | X |
| RC per calcoli renali | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale | |
| RC per crisi convulsiva | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare | |
| RC per disfunzione epatica | X |
| Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica | |
| RC per fratture patologiche | X |
| RC per lussazione | X |
| Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica | |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici | X |



| | |
|---|---|
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti | X |
| RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici | X |

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Il modello organizzativo dell'assistenza adottato dal nostro reparto è quello "Total Patient Care" dove la presa in carico dei pazienti è globale ed altamente professionalizzante. Sono presenti numerosi protocolli e procedure adottate per diverse attività assistenziali come ad esempio il trattamento delle infezioni comunitarie, la gestione delle emotrasfusioni ed altro (tutto disponibile nei faldoni in reparto).

I principali interventi assistenziali da cui lo studente può apprendere sono:

- Posizionamento e gestione del monitor multiparametrico
- Supporto al posizionamento e gestione degli accessi centrali
- Prelievo arterioso
- Esecuzione di elettrocardiogramma
- Posizionamento del catetere vescicale e gestione della cistoclisi
- Posizionamento e gestione del sondino nasogastrico
- Esecuzione di tamponi batteriologici/virologici
- Utilizzo dei presidi di ossigenazione e ventilazione assistita non invasiva