

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p>Tutor clinico Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome: ROSSELLA Cognome: SPITILLI Telefono: 3396104845 e-mail: rossella.spitilli@aslcitytorino.it</p>
<p>Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p>Degenza/Day Surgery Oculistico – ubicato al 2° Piano del Presidio Ospedaliero Oftalmico Sperino</p> <p>CONTESTO ASSISTENZIALE DI APPRENDIMENTO La struttura complessa è composta da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9 posti letto di degenza ordinaria • 28 poltrone per day surgery • 2 sale visita • 2 sale infermeria • 1 postazione accettazione/accoglienza pazienti <p>ORARI DI SERVIZIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mattino: 7 – 14.17 • Pomeriggio: 14 – 21.17 • Notte: 21 – 7.15 <p>EQUIPE DI LAVORO</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 coordinatore infermieristico • 11 infermieri • 6 oss <p>RISORSE STRUMENTALI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 lampade a fessura • 2 oftalmoscopi indiretti • 1 tavola optometrica • 1 fontifocometro • 1 elettrocardiografo • 1 monitor defibrillatore • Ferri chirurgici • 1 carrello emergenza (allestito secondo protocollo aziendale) • 5 computer

<p>Contatti e riferimenti</p> <p>Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Indirizzo: Via Filippo Juvarra 19, Torino Telefono 011/5666222 - 6042</p> <p>Mezzi pubblici: - con metropolitana fermata XVIII dicembre - con bus: 10 – 10N – 13 - 29 – 36- 46 – 49 – 56 - 59 – 59/ - 71 - 72 – 91</p>
--	--

Allegato 1
Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Patologie della retina	X
Distacco di retina Rottura di retina Pucker Maculare Emovitreo Retinite Corioretinite Occlusione venosa retinica	
Gestione interventi chirurgici sulla retina	X
Vitrectomia Asportazione olio di silicone	
Patologie della cornea	X
Ascesso corneale Endoftalmite Ulcera corneale Cheratocono	
Gestione interventi chirurgici sulla cornea	X
Cheratoplastica (PKP, DSAEK, DALK) Innesto membrana amniotica Cross-linking corneale (CXL)	
Patologie a carico di altre strutture intraoculari	X
Cataratta Neurite Papillite Uveite Iridociclite Glaucoma Dacriocistite Strabismo	

Gestione interventi chirurgici su altre strutture intraoculari	X
<ul style="list-style-type: none"> • Facoemulsificazione • Impianto IOL (Intraocular Lens = cristallino artificiale) • Sublussazione/Dislocazione IOL • Trabeculectomia • Dacriocistostomia Ciclofotocoagulazione Lavaggio camera anteriore	
Patologie delle strutture peri-extraoculari	X
Calazio Entropion Ectropion Pterigio Congiuntivite Neoformazioni palpebrali Cellulite orbitaria	
Gestione interventi chirurgici sulle strutture extraoculari	X
Exeresi e prelievo per esame istologico delle neoformazioni Correzione con intervento di chirurgia plastica	
Patologie traumatologiche / incidenti a carico dell'occhio	X
Trauma oculare e suoi annessi Ipoema	
Gestione interventi chirurgici su traumi	X
Sutura corneale Rimozione corpo estraneo Eviscerazione	

Allegato 2

Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</p> <p>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</p>	

Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <p>X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)</p> <p>X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, atelectasia, dispnea broncopolmonare)</p> <p>X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</p> <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <p>X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)</p> <p>X Malattie croniche (renali, infiammatorie, ,neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche)</p> <p>X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)</p> <p>X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali</p>	

Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) X Deturpazione X Squilibri biochimici, neurofisiologici <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento 	
Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver X Modello di coping inefficace X Salute fisica compromessa X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari X Durata dell'assistenza richiesta X Isolamento X Pause di riposo/svago insufficienti o X Risorse economiche insufficienti X Assenza o non disponibilità di sostegno 	
Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale. X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, distrofia muscolare, malattia di Alzheimer) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici) 	

Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)
- X Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento
- X Barriere psicologiche (paura, timidezza)
- X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana (perdite uditive)
- X Compromissione cognitiva per (specificare patologia)

Concetto di se, disturbo del

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Immobilità o perdita di funzioni

Coping inefficace

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)
- X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
- X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

Trattamenti

- X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

Situazionali (personali, ambientali)

- X Disorganizzazione del sistema familiare
- X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

<p>Cura di sé, deficit (alimentazione)</p> <p>Incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni X portare il cibo alla bocca 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) X Debolezza muscolare per (specificare) X Paralisi per (specificare) X Atrofia per (specificare) X Disturbi visivi X Arti non funzionanti o mancanti <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) X Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale X Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	
<p>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</p> <p>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X lavare il proprio corpo o parti X procurarsi l'acqua X regolare la temperatura o il flusso dell'acqua X percepire il bisogno di cure igieniche 	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) X Debolezza muscolare per (specificare) X Paralisi per (specificare) X Atrofia per (specificare) X Disturbi visivi X Arti non funzionanti o mancanti <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) X Affaticamento e dolore post operatori <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Deficit cognitivi X Dolore X Scarsa motivazione X Affaticamento X Confusione mentale X Ansia che paralizza <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare 	

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	

Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari per (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale	

<p>X Ansia che paralizza</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>
--

<p>Cura di sé, deficit (strumentale)</p> <p>Difficoltà a (specificare)</p> <p>X usare il telefono</p> <p>X accedere ai mezzi di trasporto</p> <p>X gestire il denaro</p> <p>X assumere i farmaci</p>	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>X Mancanza di coordinazione motoria per (specificare)</p> <p>X Paralisi per (specificare)</p> <p>X Atrofia per (specificare)</p> <p>X Contratture muscolari per (specificare)</p> <p>X Disturbi visivi</p> <p>X Arti non funzionanti o mancanti</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</p> <p>X Affaticamento e dolore post operatori</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Deficit cognitivi</p> <p>X Dolore</p> <p>X Scarsa motivazione</p> <p>X Affaticamento</p> <p>X Confusione mentale</p> <p>X Ansia che paralizza</p> <p>Fasi di sviluppo</p> <p>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	

<p>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</p>	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <p>X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansioni invasive)</p> <p>X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <p>X Febbre</p> <p>X Immobilità/posizionamento inappropriato</p> <p>X Iperattività</p> <p>X Risposta allergica</p> <p>X Irritanti chimici</p> <p>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</p> <p>X Ansia grave e repressa</p>	

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)	X
Fattori correlati Fisiopatologici Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a <ul style="list-style-type: none"> X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) X Cancro X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Risposta allergica X Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Ansia grave e repressa 	
Eliminazione urinaria compromessa Per Incontinenza urinaria (specificare): <ul style="list-style-type: none"> X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) 	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) 	
Fatigue	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Inadeguata ossigenazione tissutale (per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica) X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Aumento del consumo energetico (per amputazione, alterazione dell'andatura, uso di deambulatore o stampelle) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Stress emotivo X Disturbi del sonno 	

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Trauma fisico secondario a abuso sessuale, stupro, aggressione (specificare) X Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità, gravidanza (specificare) 	
Incontinenza urinaria funzionale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della mobilità X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	
Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorilassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	

Infezione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Possibile sede di invasione di microorganismi per trauma accidentale/intenzionale, periodo postpartum, morso di insetto/animale/umano, lesione termica, ambiente caldo/umido/buio (apparecchio gessato, pieghe cutanee) X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità) Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica) 	X
Insonnia	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) X Eccessivo dormire di giorno X Depressione X Dolore cronico X Risposte ansiose X Modifiche ambientali (specificare) X Paura 	X
Lesione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito) X Ipotensione ortostatica X Disturbi vestibolari 	X

Memoria, compromissione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazioni del SNC (per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento X Deficienze nutrizionali <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione) X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettiva, distrazioni) 	
Mobilità, compromissione /rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare (malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie, distrofia muscolare, paralisi parziale, tumore del SNC, tumore, trauma, ipertensione endocranica, deficit sensoriale) X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache) X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X obesità X dolore <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare 	
Nausea	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti dell'anestesia 	
Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti collaterali della terapia X Costo economico della terapia <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità) X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali) 	

Stress, sovraccarico psicofisico

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti

Situazionali (personali, ambientali)

- X Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)
- X Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra
- X Perdite funzionali

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse

(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per aritmie	X
Rischio di complicanze per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per reazione allergica	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per crisi convulsiva	X
RC per ipertensione intraoculare	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- Modello organizzativo per piccole equipe
- Elevato turnover (degenza media 48 ore)
- Cartella clinica informatizzata (in fase di implementazione)
- Piani assistenziali standard (in fase di implementazione)
- Patologie prevalenti:
 - Pazienti MEDICI: Neurite, papillite, uveite, endoftalmite, ascesso corneale;
 - Pazienti CHIRURGICI: Distacchi di retina, Cheratoplastica, innesto membrana amniotica, traumi, Trabeculectomia, Dacriocistite, Eviscerazione.
- Interventi assistenziali infermieristici:
 - Accettazione e accoglienza
 - Preparazione della persona che deve sottoporsi a intervento chirurgico
 - Preparazione della persona che deve sottoporsi ad esami diagnostici invasivi e non
 - Assistenza post-esame diagnostico
 - Gestione del trauma oculare/orbitale
 - Gestione ossigenoterapia
 - Gestione accessi venosi
 - Gestione della situazione di periarresto e arresto cardiaco
 - Assistenza alla persona con dolore acuto
 - Educazione terapeutica alla dimissione
- Protocolli in uso nel servizio:
 - Utilizzo dei DPI
 - Smaltimento dei rifiuti DPR 254/2003
 - Protocollo isolamento
 - Protocollo lavaggio mani
 - Protocollo MET
 - Protocollo rischio caduta
- Procedure in uso nel servizio:
 - Isolamento dei pazienti affetti da infezioni oculari
 - Gestione del consenso informato per procedure diagnostiche e interventistiche
 - Preparazione del paziente chirurgico in chirurgia oftalmologica bulbare
 - Prevenzione degli infortuni a rischio biologico
- Istruzioni operative in uso nel servizio:
 - Prevenzione degli errori in terapia conseguenti all'uso di abbreviazioni, acronimi, sigle e simboli
- PDTA in uso nel servizio:
 - Cataratta
 - Retina
 - Malattia di Fabry
 - Percorso Macula