

## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome: <b>CHIARA</b> Cognome: <b>CATTANEO</b> Telefono: 011/2403499 e-mail: <a href="mailto:chiara.cattaneo@ascittaditorino.it">chiara.cattaneo@ascittaditorino.it</a> <a href="mailto:c.cattaneo@unito.it">c.cattaneo@unito.it</a></p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p><u>C.S.M v. Paisiello 7</u> <u>N° locali:</u>11 (no posti letto) <u>Orari di apertura al pubblico:</u> Lun./Giov. /Ven. dalle 9.00 alle 17.00; Martedì dalle 8.00 alle 20.00 ( solo nella giornata di Martedì l'orario può subire variazioni determinate da attività di Pronto Socc. degli operatori del servizio); Mercoledì dalle 9.00 alle 13.00. <u>Orari di lavoro:</u> uguali agli orari di apertura al pubblico, tranne per la giornata di Mercoledì, durante la quale è sempre prevista una riunione d'èquipe dalle 13.00 alle 17.00. <u>Figure professionali:</u> 4 infermieri, 2 medici psichiatri, 1 psicologa, 1 educatore professionale e 1 assistente sociale. <u>Risorse strumentali:</u> fax, computer, apparecchi telefonici. <u>Servizi agli studenti:</u> accesso internet.</p>
<p><b>Contatti e riferimenti</b></p>	<p><u>Indirizzo:</u> v. Paisiello 7- 10154 <u>Telefono:</u> 011/ 280676- 011/ 2474369 <u>Fax:</u> 011/ 852046 <u>e-mail:</u> <a href="mailto:csmpaisiello@virgilio.it">csmpaisiello@virgilio.it</a></p>

**Come raggiungere il servizio**

Mappa percorso

Mezzi pubblici

Mappa percorso:



Mezzi pubblici : Bus 57 (Fermata 3395 - BOTTESINI)

## Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici  
prevalentemente trattati**

**Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti**

**Salute Mentale**

**X**

Patologie psicotiche/nevrotiche; disturbi dell'umore, disturbi di personalità, disturbi dell'ansia generalizzata.

**Allegato 2**
**Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate**

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Ansia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...) X Perdita reale o percepita di persone significative X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...) X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione) <b>Fasi di sviluppo</b> X Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento	
<b>Attaccamento genitore-bambino, compromesso /rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> Interruzione del processo di attaccamento per X Malattia del genitore/ del bambino <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Aspettative non realistiche (nei confronti del bambino, di se stessi) X Gravidanza indesiderata X Fattori stressanti associati alla nascita del bambino e ad altre responsabilità (problemi di salute, difficoltà nelle relazioni, abuso di sostanze, difficoltà economiche, malattia mentale) X Scarsa conoscenza e/o disponibilità dei modelli di ruolo genitoriale	
<b>Attività, intolleranza all'attività</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza) X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)	

Autolesionismo, automutilazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale)</li> </ul> <p><b>Personali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Pregressi episodi di autolesionismo</li> <li>X Abusi fisici, psichici, o sessuali</li> <li>X Inefficaci capacità di coping</li> <li>X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Bambino/adolescente: correlati all'abuso</li> </ul>	
Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Squilibri biochimici, neurofisiologici</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li>X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)</li> <li>X Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)</li> <li>X Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità</li> <li>X Insuccesso scolastico</li> <li>X Relazione inefficace con i propri genitori</li> <li>X Relazioni abusive</li> <li>X Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli</li> <li>X Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione</li> <li>X Storia di numerosi insuccessi</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento</li> <li>X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento</li> </ul>	
Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver</li> <li>X Modello di coping inefficace</li> <li>X Salute fisica compromessa</li> <li>X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</li> <li>X Durata dell'assistenza richiesta</li> <li>X Isolamento</li> <li>X Pause di riposo/svago insufficienti o</li> <li>X Risorse economiche insufficienti</li> <li>X Assenza o non disponibilità di sostegno</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (dovute a patologia psichiatrica) o disabilità fisiche (specificare)</li> </ul>	

<b>Casa, compromessa gestione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.</li> <li>X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno</li> <li>X Perdita di un familiare</li> <li>X Deficit di conoscenze</li> <li>X Insufficienza di risorse economiche</li> </ul>	
<b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione</b> (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita attenzione (per affaticamento, collera, ansia, o dolore)</li> <li>X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione cognitiva per ( patologia psichiatrica)</li> </ul>	
<b>Concetto di se, disturbo del</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</li> <li>X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</li> <li>X Preferenze sessuali</li> <li>X Differenza di sesso nell'educazione dei figli</li> <li>X Esperienze di violenza da parte dei genitori</li> <li>X Cambiamento del consueto modello di responsabilità</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità)</li> </ul>	

<b>Confusione mentale acuta</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, anestesia generale, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinenza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio.</li> <li>X Depressione, situazioni non familiari</li> <li>X Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...)</li> </ul>	
<b>Coping inadeguato della famiglia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Biofisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)</li> <li>X Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli</li> <li>X Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori</li> <li>X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli</li> </ul>	
<b>Coping inefficace</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione)</li> <li>X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione</li> <li>X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver</li> <li>X Disorganizzazione del sistema familiare</li> <li>X Inefficace capacità di problem solving</li> <li>X Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress</li> <li>X Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, , trasloco, povertà, disastro naturale)</li> <li>X Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)</li> <li>X Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale ( ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)</li> <li>X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)</li> </ul>	



**Fasi di sviluppo**

- X Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

**Cura di sé, deficit (strumentale)**

**Difficoltà a (adempiere alle normali attività di vita quotidiana)**

- X usare il telefono
- X accedere ai mezzi di trasporto
- X lavare e stirare
- X preparare i pasti
- X fare la spesa
- X gestire il denaro
- X assumere i farmaci

**X**

Fattori correlati

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Scarsa motivazione

**Immobilizzazione, sindrome da**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Depressione

**Insonnia**

**X**

Fattori correlati

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di Droghe)
- X Eccessivo dormire di giorno
- X Depressione
- X Risposte ansiose
- X Paura



<b>Memoria, compromissione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)</li> <li>X Consumo di alcol</li> <li>X Mancanza di motivazione</li> <li>X Inadeguata stimolazione</li> <li>X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)</li> </ul>	
<b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia</li> <li>X Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico)</li> <li>X Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)</li> </ul>	
<b>Nutrizione superiore al fabbisogno</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico</li> </ul>	
<b>Soffocamento, rischio</b>	<b>X</b>
<p>Vedere rischio di lesione</p>	
<b>Stipsi</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Effetti collaterali di farmaci (antidepressivi)</li> </ul>	

<b>Stress, sovraccarico psicofisico</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare) <input checked="" type="checkbox"/> Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra <input checked="" type="checkbox"/> Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia) <input checked="" type="checkbox"/> Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali <input checked="" type="checkbox"/> Perdite funzionali	
<b>Trasloco, stress da</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Risorse economiche insufficienti <input checked="" type="checkbox"/> Elevati livelli di cambiamenti ( per ammissione in strutture residenziali/di assistenza) <input checked="" type="checkbox"/> Perdita di legami sociali/familiari <input checked="" type="checkbox"/> Abbandono <input checked="" type="checkbox"/> Modifica delle relazioni familiari <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento	
<b>Trauma, rischio Vedere rischio di lesione</b>	<b>X</b>
<b>Altre Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate</b> Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)	
Gestione inefficace del regime terapeutico (persona)	
Compromissione delle interazioni sociali	



### Allegato 3

#### **PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI**

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse

(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	<b>X</b>

### Allegato 4

#### **APPRENDIMENTO OFFERTO**

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento.

Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- Interventi infermieristici assistenziali di tipo tecnico/gestuale (somministrazione terapia farmacologica IM e xOS), relazionale, educativo (es. gestione della terapia e orientamento all'interno del servizio e del dipartimento stesso), riabilitativo e risocializzante.
- Modello di presa in carico per èquipe multi professionale/ multidisciplinare, composta da infermieri (accoglimento della richiesta/primo accesso al servizio), medici psichiatri, psicologi, educatori professionali e assistenti sociali.