

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome Francesca Cognome Graglia Telefono 011 2402125 - 0112402979 e-mail francesca.graglia@unito.it
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)	A.S.L. Città di Torino ,P.O. San Giovanni Bosco Piastre Chirurgiche suddivise in 3 blocchi operatori: <ul style="list-style-type: none"> • <u>Blocco Operatorio 1 piano</u> = 6 Sale operatorie con turni di apertura articolati sulle 24 ore dal lunedì alla domenica. Percorso urgenza/emergenza. Specialità chirurgiche: chirurgia generale, chirurgia vascolare, ortopedia, neurochirurgia, • <u>Blocco Operatorio 2 piano</u> = 3 sale operatorie con turni di apertura articolati con mattino e pomeriggio dal lunedì al venerdì.(7:30-15:30 / 13:18- 21:00) Specialità chirurgiche : urologia, chirurgia toracica, ORL, ch. maxillo facciale. • <u>Blocco Operatorio 4 piano</u> = 4 sale operatorie (2 day-surgery multidisciplinare, 2 oculistica) con orari di apertura solo mattino dal lunedì al venerdì.(7:30 – 15:30) Specialità chirurgiche in regime di D.H: : terapia antalgica, chirurgia generale, chirurgia vascolare, ortopedia,ORL. Oculistica. Figure Professionali: 1 coordinatore infermieristico, xx infermieri, O.S.S, chirurghi, anestesisti che lavorano in equipe. All'interno dei blocchi è presente un locale tisaneria dove gli studenti potranno effettuare le pause previste. Possibilità di accesso ad internet in ogni blocco operatorio.
Contatti e riferimenti	Indirizzo Piazza del Donatore di Sangue n. 3 Telefono 1°piano 011 240 2125 2°piano 011 240 2121 4°piano 011 240 2841 Fax 011 240 2444 (1 piano) 011 240 2448 (4 piano)
Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici	Mezzi pubblici : linea 4 , linea 75 , linea 2 , linea 27 , linea 57.

Allegato 1

**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici
prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Malattie Cerebrovascolari	X

Malattie Endocrinologiche, metaboliche	X

Malattie Intestinali / digestive	X

Malattie Nefrologiche, genito/urinarie	X

Malattie Oncologiche	X

Malattie Osteoarticolari	X

Malattie Respiratorie	X

Malattie Traumatologiche / incidenti	X

Malattie O.R.L.	X

Malattie Vascolari	X

Allegato 2
Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)	

Aspirazione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Riduzione del livello di coscienza (per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M.di Parkinson, induzione da alcol/sostanze, coma, convulsioni, anestesia) X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo X Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso, ileo) X Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità, dilatazione uterina) X Fistola tracheo-esofagea X Compromissione dei riflessi protettivi (chirurgia o trauma facciale/orale/del collo, paraplegia/emiplegia) Trattamenti X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale) X Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona) Situazionali (personali, ambientali) X Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo	

Attività, intolleranza all'attività	X
Fattori correlati Trattamenti X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti) X Compromissione del trasporto dell'ossigeno (per ipovolemia, prolungato riposo a letto) X Stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria) X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)	

Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Ischemia del lobo frontale temporale (per ictus cerebrale, trauma orale o facciale, danno cerebrale congenito, trauma cranico, depressione del SNC, ipertensione endocranica, tumore della testa/collo/midollo spinale, ipossia cronica, riduzione della circolazione cerebrale). Trattamenti X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici) Situazionali (personali, ambientali) X Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)	
Concetto di se, disturbo del	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) Situazionali (personali, ambientali) X Immobilità o perdita di funzioni	
Confusione mentale acuta	X
Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Presenza di batteri, virus, tossine Trattamenti X Insufficiente o nessun uso di del protocollo di decontaminazione X Indumenti protettivi inappropriati o non utilizzati Situazionali (personali, ambientali) X Esposizioni concomitanti a metalli pesanti, sostanze chimiche, inquinanti atmosferici, radiazioni	
Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
Deglutizione, compromissione	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Tumore / edema tracheo-esofageo X Irritazione della cavità orofaringea X Diminuzione della salivazione Trattamenti X Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso	

<ul style="list-style-type: none"> X Riduzione della coscienza per anestesia X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione del livello di coscienza

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale) X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari) X Cancro X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea) X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari. X Effetti di un tumore su (specificare) X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza. X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomertria invasiva) X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità/posizionamento inappropriato X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti) X Risposta allergica 	

Eliminazione urinaria compromessa	X
<p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto) X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale) X Da rigurgito (presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine) 	
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Anomalie congenite delle vie urinarie X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma) X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva) 	

Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X variazione dell'aspetto (per ricovero ospedaliero, radioterapia, chemioterapia, intervento chirurgico) 	
Immobilizzazione, sindrome da	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del sensorio X Stato di incoscienza <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Intervento chirurgico X Ventilazione meccanica X Linee venose 	
Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva X Strumentazione diagnostica X Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorellassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici) 	
Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, alcolismo, immunosoppressione (secondaria a- specificare) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale X Compromissione delle difese dell'ospite per terapia radiante, trapianto d'organo, terapia farmacologica (specificare) 	
Ipotermia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Esposizione a freddo X Vestiario inadatto al clima X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività) 	

Lesione da posizionamento perioperatorio, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumentata vulnerabilità (per malattia cronica, cancro, corporatura esile, terapia radiante, osteoporosi, compromissione del sistema immunitario, disfunzione renale/epatica, infezione) X Compromissione della perfusione tissutale (per diabete mellito, anemia, ascite, malattia cardiovascolare, ipotermia, disidratazione, vasculopatia periferica, trombosi, edemi) X Vulnerabilità della stomia durante il posizionamento X Contratture preesistenti/alterazioni fisiche (artrite reumatoide, poliomielite) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Necessità di posizionamento e perdita delle abituali risposte sensoriali/protettive per anestesia X Procedure chirurgiche della durata di 2 o più ore X Vulnerabilità degli impianti/protesi durante il posizionamento <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione circolatoria (obesità, consumo di tabacco, gravidanza, neonato, temperatura bassa in sala operatoria, anziano) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Aumentata vulnerabilità alle lesioni tissutali (condizione infantile, età avanzata) 	
Nausea	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossoinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, crampi uterini, malessere da movimento, stress) (specificare) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Effetti della chemioterapia e/o farmaci X Effetti dell'anestesia 	
Respirazione, inefficace funzionalità, rischio	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia) X Soppressione del riflesso della tosse X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia) 	



Altre Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Indicare eventuali diagnosi infermieristiche e fattori correlati non incluse nell'elenco
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni,
2010)

Paura

Fattori correlati

Trattamenti

- X Perdita di controllo e imprevedibilità dei risultati secondari a imminente intervento chirurgico e suo esito.

Allegato 3
PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI

Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse

(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare	
RC per emorragia	X
RC per ipovolemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria	
RC per ipossiemia	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica	
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per reazione allergica	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale	
RC per ipertensione endocranica	X
Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare	
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Il modello assistenziale adottato è il Primary Nursing con presa in carico e gestione della persona assistita nel suo percorso clinico da parte di un team multidisciplinare composto da strumentisti, da nurse d'anestesia, da O.S.S., da medici anestesisti, da medici chirurghi e all'occorrenza da medici specialisti in vari settori.

Durante il tirocinio lo studente avrà l'opportunità formativa di seguire il percorso assistenziale della persona assistita e di creare un piano assistenziale personalizzato, definire in collaborazione con l'equipe gli obiettivi e il programma assistenziale.

All'interno dei tre blocchi operatori della piastra chirurgica lo studente potrà sperimentare l'assistenza perioperatoria in interventi chirurgici in elezione di bassa, media e alta intensità di cura.

Gli **ambiti clinici di intervento** prevalenti sia in regime di Day Hospital che di elezione sono:

- Chirurgia Generale
- Chirurgia Vascolare
- Chirurgia Maxillo facciale e O.R.L.
- Chirurgia Ortopedica
- Neurochirurgia
- Chirurgia Urologica
- Chirurgia Toracica
- Terapia Antalgica
- Oculistica
- Percorso Emergenza/Urgenza

Le principali attività che lo studente potrà sperimentare saranno le seguenti:

- Accoglienza nel Blocco Operatorio utilizzando la check –list ministeriale.
- Comunicare con la persona assistita in relazione alle sue condizioni emotive ai livelli di coscienza alterati all'accoglienza e/o in seguito all'intervento.
- Preparazione del setting operatorio specifico per la tipologia dell'intervento da eseguire.(apparecchiature elettromedicali e ausili per il posizionamento).

PREOPERATORIO:

- Sala Risveglio: Accoglienza della persona assistita prima dell'intervento chirurgico e preparazione per l'ingresso in sala operatoria.
- Controllo apparecchiature elettromedicali presenti in sala risveglio e compilazione/controllo check-list carrello urgenze, intubazione difficile, frigo emoteca.



Zona materiale sterile: controllo scadenze strumentario sterile, preparazione materiale necessario all'esecuzione degli interventi inseriti nelle liste operatorie

INTRAOPERATORIO:

- Compilazione della cartella infermieristica.
- Monitorizzazione della persona assistita e reperimento accesso venoso.
- Collaborazione all'induzione dell'anestesia di tipo generale (narcosi), peridurale, locale o plessica)
- Posizionamento della persona assistita (supina, prona, litotomica, laterale....)utilizzando i presidi necessari.
- Preparazione strumentario chirurgico e allestimento campo sterile (tipi di container specifici e teleria sterile dedicata, lavaggio chirurgico e disinfezione del campo operatorio..)
- Compilazione della chek relativa alla procedura conteggio delle garze-,strumentario o altro materiale all'interno del sito chirurgico.
- Prelievo per confezionamento, conservazione ed invio del campione istologico (protocollo con procedura).
- Gestione della medicazione della ferita chirurgica, dei drenaggi, accessi venosi centrali e periferici, cateterini peridurali.

POSTOPERATORIO:

- Sala Risveglio: accoglienza della persona assistita e monitoraggio dei parametri vitali(funzione respiratoria, cardiocircolatoria ,T.C.), del dolore, della diuresi, delle condizioni della ferita chirurgica e dei drenaggi, Effettuare un bilancio idrico. Valutazione dello stato di coscienza, nausea e/o vomito.
- Comunicazione in collaborazione con l'equipe assistenziale dell'esito dell'intervento. Organizzare e gestire in collaborazione con l'equipe assistenziale la fase di dimissione/trasferimento ad altra unità operativa.

Sub-sterilizzazione: percorso dello strumentario chirurgico utilizzato (decontaminazione, stoccaggio, trasferimento in centrale di sterilizzazione).