

OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Dipartimento Salute Mentale

SS SPDC A.S.

Contesto	
Tutor clinico Contatti e riferimenti	Nome ALESSANDRA Cognome COTUGNO e-mail alessandra.cotugno@unito.it
Struttura/servizio Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc) Contatti e riferimenti	SPDC PO Amedeo di Savoia - padiglione H Posti letto: 13 Visite su appuntamento Turni infermieri/OSS: mattino ore 7/14,02 - pomeriggio ore 14/21,02 – notte ore 21-7 Medici psichiatri, infermieri, OSS, psicologa, educatrice PC, elettrocardiografo, presidi per la mobilitazione, aspiratore tracheale, carrello urgenze Mensa ospedaliera, accesso internet limitato
Come raggiungere il servizio Mappa percorso Mezzi pubblici	Corso Svizzera n. 164, Torino Tel. 0114393875 Fax 0114393876 e-mail oas.spdc@aslcitytorino.it GTT Bus 59, 59/ (fermata SVIZZERA) Tram 3, 9 (fermata OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA)

Allegato 1
Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

Salute Mentale	X
Psicosi, disturbi dell'umore, disturbi di personalità	

Allegato 2
Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri) <input checked="" type="checkbox"/> Perdita reale o percepita di persone significative <input checked="" type="checkbox"/> Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale) <input checked="" type="checkbox"/> Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...) <input checked="" type="checkbox"/> Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione) Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Adolescente: morte di (specificare), minaccia del concetto di se correlato a sviluppo sessuale, variazione dei rapporti con coetanei <input checked="" type="checkbox"/> Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento	

Aspirazione, rischio di	X
Fattori correlati Trattamenti X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per sedazione) Fasi di sviluppo X Persona anziana: dentizione inadeguata	
Attaccamento genitore-bambino, compromesso /rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici Interruzione del processo di attaccamento per X Malattia del genitore/ del bambino Situazionali (personali, ambientali) X Fattori stressanti associati alla nascita del bambino e ad altre responsabilità (problemi di salute, difficoltà nelle relazioni, abuso di sostanze, difficoltà economiche, malattia mentale)	
Attività, intolleranza all'attività	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza) X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)	
Autolesionismo, automutilazione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, autismo, compromissione mentale) Personali X Pregressi episodi di autolesionismo X Abusi fisici, psichici, o sessuali X Inefficaci capacità di coping X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti	

Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche) X Squilibri biochimici, neurofisiologici <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa) X Senso di fallimento (per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna) X Aggressione subita personalmente o di altra persona della stessa età / comunità X Insuccesso scolastico X Relazione inefficace con i propri genitori X Relazioni abusive X Aspettative irrealistiche verso di se o verso i propri genitori/figli X Rifiuto da parte dei genitori, punizioni incoerenti, abbandono o insuccesso correlato a istituzionalizzazione X Storia di numerosi insuccessi <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Età scolare: insuccesso scolastico, perdita del gruppo dei coetanei, ripetuti feedback negativi X Adolescente: perdita di autonomia/indipendenza per (specificare), rottura di relazioni con coetanei/amici, problemi scolastici, perdita di altre persona significative X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento 	
Avvelenamento, rischio	X
Vedere lesione, rischio	
Cadute, rischio	X
Vedere lesione, rischio	
Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Modello di coping inefficace X Salute fisica compromessa X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari X Isolamento X Risorse economiche insufficienti X Assenza o non disponibilità di sostegno <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali o disabilità fisiche 	

Casa, compromessa gestione	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze. X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno X Perdita di un familiare X Deficit di conoscenze X Insufficienza di risorse economiche 	
Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita attenzione (per affaticamento, collera, ansia, o dolore) X Barriere psicologiche (paura, timidezza) X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione cognitiva 	
Concetto di se, disturbo del	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Fisiopatologici</p> <ul style="list-style-type: none"> X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa X Immobilità o perdita di funzioni X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali X Preferenze sessuali X Esperienze di violenza da parte dei genitori X Cambiamento del consueto modello di responsabilità <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Età di mezzo (perdita di ruoli/responsabilità) X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità) 	

Confusione mentale acuta	X
Fattori correlati Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Disturbo del metabolismo cerebrale per intossicazione da farmaci, astinenza da alcol, sedativi/ipnotici, metalli pesanti, monossido di carbonio, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinenza da alcool, sedativi, ipnotici, intossicazione da metalli pesanti o da monossido di carbonio X Depressione, situazioni non familiari X Intossicazioni chimiche o da farmaci (cocaina, eroina, metanfetamine, metadone, altri stupefacenti...) 	
Coping inadeguato della famiglia	X
Fattori correlati Biofisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive) X Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli X Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli 	
Coping inefficace	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Cronicità della condizione, variazioni biochimiche dell'encefalo (disordine della personalità, disordine bipolare, schizofrenia, disordine da scarsa attenzione) X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Scarso controllo degli impulsi e bassa tolleranza alla frustrazione X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver X Disorganizzazione del sistema familiare X Inefficace capacità di problem solving X Aumento del consumo di cibo per reazione allo stress X Modificazione dell'ambiente (per guerre, mancanza di alloggio, lavoro precario, trasloco, povertà, disastro naturale) X Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento) X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi) 	

Fasi di sviluppo

- X Bambino/adolescente: inadeguato controllo degli impulsi, panico, rifiuto da parte dei coetanei, abuso di sostanze da parte dei genitori, metodi disciplinari incoerenti, trauma infantile, rifiuto dei genitori, paura di insuccessi
- X Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

Cura di sé, deficit (alimentazione)
Incapacità di (specificare):

- X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni
- X portare il cibo alla bocca

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Mancanza di coordinazione motoria per confusione mentale
- X Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- X Comportamenti ritualistici
- X Deficit somatici

Situazionali (personali, ambientali)

- X Deficit cognitivi
- X Scarsa motivazione
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)
Ridotta e/o incapacità di (specificare):

- X lavare il proprio corpo o parti
- X regolare la temperatura o il flusso dell'acqua
- X percepire il bisogno di cure igieniche

X

Fattori correlati

Fisiopatologici

- X Mancanza di coordinazione motoria per (confusione mentale)
- X Regressione a un precedente stadio di sviluppo
- X Comportamenti ritualistici
- X Deficit somatici

Situazionali (personali, ambientali)

- X Deficit cognitivi
- X Scarsa motivazione
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale) Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza	
Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale) Incapacità o mancanza di volontà per (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici <input checked="" type="checkbox"/> Deficit somatici Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza	
Cura di sé, deficit (strumentale) Difficoltà a (specificare) <input checked="" type="checkbox"/> usare il telefono <input checked="" type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto <input checked="" type="checkbox"/> lavare e stirare <input checked="" type="checkbox"/> preparare i pasti <input checked="" type="checkbox"/> fare la spesa <input checked="" type="checkbox"/> gestire il denaro <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Regressione a un precedente stadio di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Comportamenti ritualistici	

X Deficit somatiformi Situazionali (personali, ambientali) X Deficit cognitivi X Scarsa motivazione X Confusione mentale X Ansia che paralizza
--

Deambulazione, compromissione, rischio Vedere mobilità, compromissione, rischio	X
---	----------

Deglutizione, compromissione	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) X Alterazione del livello di coscienza	

Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)	X
Fattori correlati Fisiopatologici Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi) Situazionali (personali, ambientali) X Febbre X Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Ansia grave e repressa	

Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) X Bisogno di dipendenza non soddisfatto X Ansia grave e repressa	

Eliminazione urinaria compromessa	X
Per Incontinenza urinaria (specificare): X Da sforzo (perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale) X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale) X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)	
Fattori correlati Fisiopatologici X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori, neuropatia alcolica e/o diabetica, ictus cerebrale, parkinsonismo)	

Fatigue	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità) X Eccessive richieste di ruolo X Richieste emozionali soverchianti X Stress emotivo X Disturbi del sonno 	
Immagine corporea, Disturbo/Rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Depressione Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Neonato/bambino/adolescente: sindrome Down, artrite giovanile, osteogenesi imperfetta, paralisi cerebrale, disabilità mentale/fisica, autismo, spina bifida 	
Incontinenza fecale	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive) 	
Incontinenza urinaria da sforzo	X
Fattori correlati Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdita di tono muscolare 	
Incontinenza urinaria da urgenza	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: diminuita capacità vescicale 	

Incontinenza urinaria funzionale	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione della mobilità X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare) <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	
Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Trattamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> X Riduzione del tono muscolare per terapia farmacologica (farmaci ansiolitici) <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale <p>Fasi di sviluppo</p> <ul style="list-style-type: none"> X Persona anziana: perdite motorie/sensitive 	
Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità 	
Insonnia	X
<p>Fattori correlati</p> <p>Situazionali (personali, ambientali)</p> <ul style="list-style-type: none"> X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe) X Eccessivo dormire di giorno X Depressione X Inadeguata attività fisica durante il giorno X Risposte ansiose X Modifiche ambientali (specificare) X Paura 	

Integrità mucosa orale, compromissione	X
Fattori correlati <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata igiene orale <input checked="" type="checkbox"/> Incapacità di provvedere all'igiene orale	
Lesione, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale) Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Alterata capacità di giudizio (per stress, droghe, alcol, depressione) <input checked="" type="checkbox"/> Ambiente non familiare (es. Ospedale) <input checked="" type="checkbox"/> Scarpe inadatte <input checked="" type="checkbox"/> Andatura instabile Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare	
Liquidi, insufficiente volume di	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)	
Memoria, compromissione	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Riduzione della quantità/qualità delle informazioni elaborate (per deficit visivi/uditivi, livello di istruzione, ridotte capacità intellettive, abitudini di apprendimento, benessere fisico insufficiente, affaticamento) Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Effetti dei farmaci sulla memorizzazione delle informazioni Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione) <input checked="" type="checkbox"/> Consumo di alcol <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)	

Mobilità, compromissione /rischio di	X
Fattori correlati Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> fatigue <input checked="" type="checkbox"/> mancanza di motivazione Fasi di sviluppo <input checked="" type="checkbox"/> Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare	
Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio	X
Vedere mobilità, compromissione, rischio	
Nausea	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intossicazioni da farmaci, stress)	
Non adesione (a indicazioni terapeutiche)	X
Fattori correlati Fisiopatologici <input checked="" type="checkbox"/> Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi) <input checked="" type="checkbox"/> Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato Trattamenti <input checked="" type="checkbox"/> Effetti collaterali della terapia <input checked="" type="checkbox"/> Ambiente non terapeutico <input checked="" type="checkbox"/> Terapia complessa non controllata/prolungata <input checked="" type="checkbox"/> Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace Situazionali (personali, ambientali) <input checked="" type="checkbox"/> Malattia concomitante di un membro della famiglia (mancato sostegno da parte della famiglia/amici/comunità) <input checked="" type="checkbox"/> Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio <input checked="" type="checkbox"/> Modificazione dello stato lavorativo <input checked="" type="checkbox"/> Modificazione della copertura assicurativa per le spese sanitarie <input checked="" type="checkbox"/> Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)	

Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza) X Vomito autoindotto, esercizio fisico eccessivo in rapporto alle calorie assunte, anoressia X Rifiuto ad alimentarsi (timore di essere avvelenato/ comportamento paranoico) X Inappetenza/agitazione fisica (per disturbo bipolare) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione) 	
Nutrizione superiore al fabbisogno	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Alterato modello di sazietà (specificare) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Alterazione del senso di sazietà (per farmaci, radiazioni) Fasi di sviluppo <ul style="list-style-type: none"> X Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico 	
Soffocamento, rischio Vedere rischio di lesione	X
Stipsi	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore) Trattamenti <ul style="list-style-type: none"> X Effetti collaterali di farmaci (specificare) Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) X Modello di evacuazione irregolare 	
Stress, sovraccarico psicofisico	X
Fattori correlati Fisiopatologici <ul style="list-style-type: none"> X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti Situazionali (personali, ambientali) <ul style="list-style-type: none"> X Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare) X Necessità di far fronte a morte, aggressione, guerra X Variazione reale o percepita dello stato socio- economico (per disoccupazione, promozione, nuovo lavoro, pensionamento, distruzione di proprietà personali, perdita/cambiamento della casa, malattia) X Necessità di far fronte a violenza in famiglia, abuso di sostanza, nuovo componente familiare, problemi relazionali X Perdite funzionali 	

Trasloco, stress da	X
Fattori correlati Fisiopatologici X Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima) Situazionali (personali, ambientali) X Risorse economiche insufficienti X Elevati livelli di cambiamenti (per ammissione in strutture residenziali/di assistenza) X Perdita di legami sociali/familiari X Abbandono X Modifica delle relazioni familiari X Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento	
Trauma, rischio	X
Vedere rischio di lesione	

Allegato 3

PROBLEMI COLLABORATIVI <u>PRELEVALEMENTEMENTE</u> TRATTATI Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2015)	
Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X

Allegato 4

APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

- Sperimentare la relazione d'aiuto con pazienti in fase di scompenso psichico acuto, modulando la "giusta distanza": un equilibrio tra distacco emotivo ed eccessivo coinvolgimento che determina la qualità della relazione stessa.
- Approfondire l'iter del TSO, dagli aspetti giuridici all'approccio con il paziente.
- Acquisire tecniche relazionali anche volte a ridurre l'aggressività (es. de-escalation, contenimento emotivo).
- Preparazione e somministrazione di psicofarmaci con relativo riconoscimento e controllo degli effetti collaterali.
- Osservazione delle tecniche di colloquio clinico.
- Lavoro in equipe multi-professionali, partecipazione alle riunioni quotidiane di definizione del piano di cura dei pazienti e collaborazione con i CSM di competenza.
- Sperimentazione del modello organizzativo Primary Nursing.