

## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome <b>ALESSANDRO</b> Cognome <b>SCHIVO</b> Telefono 3351823736 / 0118122565 e-mail <a href="mailto:alessandro.schivo@unito.it">alessandro.schivo@unito.it</a> <a href="mailto:direzione@residenzetrifoglio.it">direzione@residenzetrifoglio.it</a></p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc N°locali, n° posti letto, Orari apertura al pubblico, Orari di lavoro, Figure professionali Risorse strumentali Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p><b>"Rsa Il Trifoglio" Via Andorno 17, Torino</b> <a href="https://www.areabios.com/trifoglio-torino/">https://www.areabios.com/trifoglio-torino/</a></p> <p>La struttura è composta da 4 piani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P.Terra : uffici amministrativi/sanitari, centralino, 1 nucleo NAT (Villa Andorno).</li> <li>• P.Piano: 1 nucleo NAT (Varallo1) e 2 nuclei RSA - 20 posti letto ciascuno (Mongrando 1 e Oropa 1)</li> <li>• S.Piano: 3 nuclei da 20 posti letto (Varallo2, Mongrando2 e Oropa2)</li> <li>• T.Piano: 3 nuclei da 20 posti letto (Varallo3, Mongrando3 e Oropa3)</li> </ul> <p>Per un totale di 200 posti letto RSA suddivisi in 9 nuclei da 20 posti letto circa.</p> <p><b>"RAF-Villa Mongrando" Via Mongrando ,Torino</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubicata al piano terra della struttura, la RAF Villa Mongrando è un nucleo di 20 posti letto per persone affette da disabilità psico-fisico.</li> </ul> <p>Il personale infermieristico e OSS è presente sulle 24 ore. Le attività sono organizzate su tre turni lavorativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6.45-14.00</li> <li>• 13.45-21.00</li> <li>• 20.45-07.00</li> </ul> <p>Accesso ad internet mediante postazione PC e WiFi nell'intera struttura. Possibilità di consumare i pasti in sede mediante la mensa dipendenti. Possibilità di parcheggio auto all'interno della struttura.</p>
<p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	

**Allegato 1**
**Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

**Disabilità, malattie ad alto grado di tutela** **X**

Persone non autosufficienti per patologia ed età, a volte sole e spesso non in grado di gestire e tutelare i propri interessi e quindi, sottoposte a provvedimenti di Amministrazione di Sostegno o tutela.

**Malattie Cardiovascolari** **X**

Cardiopatie ischemiche di vario genere, FA in TAO, ipertensione, anemie.

**Malattie Cerebrovascolari** **X**

Ictus in atto/ esiti, emorragia cerebrale, demenze vascolari di vario genere (vascolare, tipo Alzheimer...), parkinsonismo.

**Malattie Endocrinologiche, metaboliche** **X**

Diabete tipo II trattato con dieta, terapia ipoglicemizzante orale e/ o insulina, dislipidemie.

**Malattie Intestinali / digestive** **X**

Incontinenza fecale, stipsi, disfagia; alimentazione attraverso SNG, PEG.

**Malattie Infettive** **X**

Infezione da C.Difficilis, IVU.

**Malattie Nefrologiche, genito/urinarie** **X**

IRC, incontinenza urinaria, CV

**Malattie Neuromuscolari** **X**

Sclerosi multipla.



<b>Malattie Oncologiche</b>	<b>X</b>
Neoplasie di vario genere.	
<b>Malattie Osteoarticolari</b>	<b>X</b>
Artrosi, fratture e/o esiti di vario genere (femore, bacino, arti superiori), osteoporosi.	
<b>Malattie Respiratorie</b>	<b>X</b>
BPCO.	
<b>Salute Mentale</b>	<b>X</b>
Disturbi comportamentali, psicosi , schizofrenie, depressioni.	
<b>Altro (specificare)</b>	<b>X</b>
Sindrome d'allettamento, LDP	

**Allegato 2**
**Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate**

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

<b>Ansia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</li> <li>X Perdita reale o percepita di persone significative</li> <li>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</li> <li>X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)</li> <li>X Cambiamento reale o percepito delle condizioni socioeconomiche (disoccupazione, cambiamento di lavoro, licenziamento, promozione)</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adulto: minaccia al concetto di se per ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento</li> <li>X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</li> </ul>	
<b>Aspirazione, rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Riduzione del livello di coscienza ( per demenza pre-senile, trauma cranico, ictus cerebrale, M. di Parkinson).</li> <li>X Depressione dei riflessi della tosse/faringeo</li> <li>X Ritardato svuotamento gastrico (per ostruzione intestinale, sindrome da reflusso)</li> <li>X Aumento della pressione gastrica (per posizione ginecologica, ascite, obesità)</li> <li>X Compromissione della deglutizione o diminuzione dei riflessi laringeo/glottico (per miastenia grave, catatonìa, M di Parkinson, ictus cerebrale, sclerosi multipla)</li> <li>X Compromissione dei riflessi protettivi ( paraplegia/emiplegia)</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Depressione dei riflessi laringeo/glottico (per tracheostomia/trachetomia, sedazione, nutriz. enterale)</li> <li>X Compromissione della capacità di tossire (per immobilizzazione della mandibola, posizione prona)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Incapacità/difficoltà di sollevare la parte superiore del corpo</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: dentizione inadeguata</li> </ul>	

Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p><b>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)</li> <li>X Sistema respiratorio (bronco pneumopatia cronica ostruttiva, broncopolmonare)</li> <li>X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</li> </ul> <p><b>Aumento del fabbisogno metabolico per</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Infezioni acute o croniche (virali, epatite)</li> <li>X Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche,, muscolo scheletriche)</li> <li>X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione del trasporto dell'ossigeno ( per ipovolemia, prolungato riposo a letto)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)</li> <li>X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)</li> <li>X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del trofismo muscolare, comparsa di deficit sensoriali</li> </ul>	
Autolesionismo, automutilazione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Squilibri biochimici / neurofisiologici (disturbo bipolare, compromissione mentale, schizofrenia)</li> </ul> <p><b>Personali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Progressi episodi di autolesionismo</li> <li>X Abusi fisici, psichici, o sessuali</li> <li>X Inefficaci capacità di coping</li> <li>X Incapacità di esprimere verbalmente i sentimenti</li> </ul>	
Autostima, Disturbo/Rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazione dell'aspetto (per perdita di parti del corpo, di una o più funzioni organiche)</li> <li>X Deturpazione</li> <li>X Squilibri biochimici, neurofisiologici</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Bisogno di dipendenza non soddisfatto</li> <li>X Senso di abbandono (per morte di una persona significativa, rapimento/uccisione di un figlio, separazione da una persona significativa)</li> <li>X Senso di fallimento ( per perdita del lavoro/incapacità di lavorare, problemi economici, liti coniugali, parenti acquisiti, aumento/diminuzione del peso, separazione, disoccupazione, problemi relazionali, patrigno/matrigna)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adulto: per modificazioni associate a invecchiamento</li> <li>X Persona anziana: per perdita di persone, funzioni, economiche, pensionamento</li> </ul>	



<b>Avvelenamento, rischio</b> Vedere lesione, rischio	<b>X</b>
<b>Cadute, rischio</b> Vedere lesione, rischio	<b>X</b>
<b>Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, disabilità)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver</li> <li>X Modello di coping inefficace</li> <li>X Salute fisica compromessa</li> <li>X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</li> <li>X Durata dell'assistenza richiesta</li> <li>X Isolamento</li> <li>X Pause di riposo/svago insufficienti o</li> <li>X Risorse economiche insufficienti</li> <li>X Assenza o non disponibilità di sostegno</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità mentali (demenze di vario genere) o disabilità fisiche (non autosufficienti funzionali e/o motori)</li> </ul>	
<b>Casa, compromessa gestione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, neoplasie, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (figlio/ caregiver) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale),intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria,depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.</li> <li>X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno</li> <li>X Perdita di un familiare</li> <li>X Deficit di conoscenze</li> <li>X Insufficienza di risorse economiche</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali)</li> </ul>	

<b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione</b> (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Pensieri disordinati e non realistici secondari a schizofrenia, delirio, psicosi, paranoia</li> <li>X Alterazione della funzionalità motoria dei muscoli del linguaggio</li> <li>X Ischemia cerebrale.</li> <li>X Patologia del sistema nervoso (es miastenia grave, malattia di Alzheimer) mascellare, adentulia, disartria)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di produrre il linguaggio (per intubazione endotracheale, tracheotomia, tracheostomia, laringectomia, intervento chirurgico cranico, al viso, al collo, alla bocca, dolore alla bocca o faringeo, depressione cognitiva da farmaci deprimenti il SNC/anestetici)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita attenzione (per affaticamento collera, ansia, o dolore)</li> <li>X Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento</li> <li>X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana (perdite uditive)</li> <li>X Compromissione cognitiva per VCC, fatti ischemici e demenze di vario genere.</li> </ul>	
<b>Concetto di se, disturbo del</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Senso di abbandono/fallimento secondario a perdita del lavoro/della capacità di lavorare, divorzio, separazione o perdita di persona significativa</li> <li>X Immobilità o perdita di funzioni</li> <li>X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)</li> </ul>	
<b>Confusione mentale acuta</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fattori di rischio</b></p> <p>Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/iper natremia, ipo/iper glicemia)</li> <li>X Deficit nutrizionali (folati, vitamina B12, anemia, deficit niacina, deficit magnesio)</li> <li>X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale)</li> <li>X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, polmonite)</li> <li>X Infezioni (sepsi, infezione delle vie urinarie nell'anziano)</li> <li>X Disordini metabolici ed endocrini (iper/ipo tiroidismo)</li> <li>X Disordini del SNC (ictus cerebrale, infarti multipli cerebrale, tumore, trauma cranico, crisi convulsive e stati post convulsivi)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p>	

- X Disturbo del metabolismo cerebrale per intervento chirurgico, intossicazione da farmaci, sedativi/ipnotici, effetti collaterali dei farmaci (neurolettici/narcotici, anestesia generale, effetti collaterali da farmaci come diuretici, digitale, propanololo, atropina, ipoglicemizzanti, barbiturici, litio, fenitoina, acyclovir, anticolinergici, ecc)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Disturbo del metabolismo cerebrale per astinenza da alcool, sedativi, ipnotici.
- X Dolore, fecaloma, immobilità,
- X Depressione, situazioni non familiari

**Contaminazione, rischio di (della persona, della comunità, della famiglia)**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Presenza di batteri, virus, tossine
- X Fattori nutrizionali (obesità, deficienze di vitamine e sali minerali)

**Fasi di sviluppo**

- X Persone anziane

**Coping inadeguato della famiglia**

**X**

Fattori correlati

**Biofisiopatologici**

- X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)
- X Aspettative non realistiche dei genitori nei confronti di se stessi/dei figli
- X Aspettative non realistiche dei figli nei confronti di se stessi/dei genitori
- X Bisogni psicosociali non soddisfatti dai genitori / dai figli

**Coping inefficace**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Complessità del regime di autocura, variazioni neurologiche nell'encefalo (Morbo di Alzheimer, infarto cerebrale, sclerosi multipla, malattie in stadio terminale)
- X Alterazione dell'integrità corporea (perdita di una parte del corpo, deturpazione)
- X Alterazione dello stato d'animo (per reazioni organiche, tumore cerebrale, assunzione di sostanze, reazioni organiche, ritardo mentale)

**Trattamenti**

- X Separazione dalla famiglia e dalla casa (ospedalizzazione, ricovero in struttura sanitaria residenziale, ecc)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
- X Disorganizzazione del sistema familiare
- X Inefficace capacità di problem solving
- X Rottura legami affettivi (morte, separazione, diserzione, carcere, istituzionalizzazione, adozione/affidamento)

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

<b>Cura di sé, deficit (alimentazione)</b> <b>Incapacità di (specificare):</b> <input checked="" type="checkbox"/> tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni <input checked="" type="checkbox"/> portare il cibo alla bocca	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria per malattie degenerative. <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per immobilizzazione e/o allettamento. <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi per problematiche inerenti a traumi o fatti ischemici. <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <b>Trattamenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	
<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> <b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b> <input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria. <input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità. <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolae. <input checked="" type="checkbox"/> Paralisi. <input checked="" type="checkbox"/> Atrofia. <input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari. <input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso <input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi <input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti <b>Trattamenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	



<p><b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b></p> <p><b>Ridotta e/o incapacità di (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> cambiare capi di vestiario</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche</li> </ul>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Paralisi.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Atrofia.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari.</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dolore</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>	

<p><b>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</b></p> <p><b>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</li> </ul>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Mancanza di coordinazione motoria</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Spasticità o flaccidità</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Paralisi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Atrofia</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Contratture muscolari</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Stato comatoso</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disturbi visivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Arti non funzionanti o mancanti</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deficit cognitivi</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Dolore</li> </ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>X Scarsa motivazione</li> <li>X Affaticamento</li> <li>X Confusione mentale</li> <li>X Ansia che paralizza</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>	
--	--

<b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b> <b>Difficoltà a (specificare)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X usare il telefono</li> <li>X accedere ai mezzi di trasporto</li> <li>X gestire il denaro</li> <li>X assumere i farmaci</li> </ul>	<b>X</b>
--	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Mancanza di coordinazione motoria</li> <li>X Spasticità o flaccidità</li> <li>X Debolezza muscolare</li> <li>X Paralisi</li> <li>X Atrofia</li> <li>X Contratture muscolari</li> <li>X Stato comatoso</li> <li>X Disturbi visivi</li> <li>X Arti non funzionanti o mancanti</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)</li> <li>X Affaticamento e dolore post operatori</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Deficit cognitivi</li> <li>X Dolore</li> <li>X Scarsa motivazione</li> <li>X Affaticamento</li> <li>X Confusione mentale</li> <li>X Ansia che paralizza</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</li> </ul>	
--	--

<b>Deambulazione, compromissione, rischio</b> <b>Vedere mobilità, compromissione, rischio</b>	<b>X</b>
--	----------

<b>Deglutizione, compromissione</b>	<b>X</b>
-------------------------------------	----------

Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione/assenza del riflesso faringeo, difficoltà di masticazione e riduzione della sensibilità (per paralisi cerebrale, miastenia grave, M.di Parkinson, tumore cerebrale, danno cerebrale, ictus cerebrale, danno nervi cranici)</li> <li>X Irritazione della cavità orofaringea</li> <li>X Diminuzione della salivazione</li> </ul> <b>Trattamenti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Ricostruzione chirurgica della bocca/faringe/mandibola/naso</li> <li>X Riduzione della coscienza per anestesia</li> <li>X Ostruzione meccanica secondaria a cannula tracheostomica</li> </ul>	
---	--

<p>X Esofagite da radioterapia</p> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <p>X Alterazione del livello di coscienza</p> <p>X Fatigue</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <p>X Persona anziana: riduzione della salivazione o del gusto</p>
---

<b>Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)</li> <li>X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)</li> <li>X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li>X Fatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)</li> <li>X Effetti di un tumore</li> <li>X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</li> <li>X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Febbre</li> <li>X Immobilità/posizionamento inappropriato</li> <li>X Iperattività</li> <li>X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li>X Ansia grave e repressa.</li> </ul>	

<b>Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disordini muscolo scheletrici (fratture, artrite, contrattura muscolare, spasmi, patologia a carico del midollo spinale)</li> <li>X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)</li> <li>X Infiammazione di nervi, tendini, capsula articolare, articolazioni, muscoli, strutture articolari.</li> <li>X Fatigue, malessere o prurito secondari a a malattie infettive (pancreatite, epatite)</li> <li>X Effetti di una neoplasia</li> <li>X Dolori addominali, diarrea, vomito secondari a gastroenterite, ulcera gastrica, influenza.</li> <li>X Infiammazione e spasmi della muscolatura liscia per calcoli renali, infezioni gastrointestinali, anestesia, effetti collaterali.</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Febbre</li> <li>X Immobilità/posizionamento inappropriato</li> <li>X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)</li> <li>X Ansia grave e repressa</li> </ul>	



<b>Eliminazione urinaria compromessa</b>	<b>X</b>
<p>Per Incontinenza urinaria (specificare):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</b></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Da sforzo ( perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)</b></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)</b></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)</b></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)</b></li> <li><input checked="" type="checkbox"/> <b>Da rigurgito ( presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)</b></li> </ul>	
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)</li> </ul>	

<b>Fatigue</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Stato ipermetabolico (per malattie virali, febbre)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, insufficienza renale)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla, M. Parkinson, AIDS)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Deficit nutrizionali o alterazioni del metabolismo dei nutrienti (per nausea, vomito, diarrea, effetti collaterali dei farmaci, diabete mellito)</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Processo infiammatorio cronico (per AIDS, artrite, epatite, malattia infiammatoria intestinale, insufficienza renale)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Disturbi del sonno</li> </ul>	

<b>Immagine corporea, Disturbo/Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Variazioni dell'aspetto per malattia cronica, trauma grave, perdita di una parte del corpo, perdita di una funzione organica, invecchiamento</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Effetti sull'aspetto di obesità, immobilità.</li> </ul>	

Immobilizzazione, sindrome da	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione neuromuscolare (per sclerosi multipla, paralisi parziale/totale, lesione del midollo spinale)</li> <li>X Compromissione muscolo-scheletrica (per fratture e malattie reumatiche)</li> <li>X Cancro</li> <li>X Disordini psichiatrici/della salute mentale (per depressione grave, stato catatonico, fobie gravi)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile</li> </ul>	
Incontinenza fecale	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle funzioni cognitive</li> <li>X Iperdistensione rettale per stipsi cronica</li> <li>X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva, compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla).</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)</li> </ul>	
Incontinenza urinaria da sforzo	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, inadeguata igiene personale</li> <li>X Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdita di tono muscolare</li> </ul>	
Incontinenza urinaria da urgenza	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: diminuita capacità vescicale</li> </ul>	

Incontinenza urinaria funzionale	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della mobilità</li> <li>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</li> </ul>	
Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della mobilità</li> <li>X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale</li> <li>X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: perdite motorie/sensitive</li> </ul>	
Infezione, rischio di	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per cancro, malattie respiratorie, ematologiche, periodontali, malattie epatiche, artrite, diabete mellito, malattie ereditarie, AIDS, immunosoppressione.</li> <li>X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità)</li> <li>X Contatto con agenti contaminanti (infezioni nosocomiali o di comunità)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)</li> </ul>	

<b>Insonnia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/ respiratori, arteriosclerosi periferica)</li> <li>X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)</li> </ul> <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Eccessiva iperattività (per disturbo bipolare/ da deficit dell'attenzione, panico, uso di droghe)</li> <li>X Eccessivo dormire di giorno</li> <li>X Depressione</li> <li>X Inadeguata attività fisica durante il giorno</li> <li>X Dolore cronico</li> <li>X Risposte ansiose</li> <li>X Paura</li> </ul>	
<b>Integrità mucosa orale, compromissione</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inadeguata igiene orale</li> <li>X Incapacità di provvedere all'igiene orale</li> </ul>	
<b>Ipertermia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione della circolazione (per persona sovrappeso/sottopeso, disidratazione)</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età</li> </ul>	
<b>Ipotermia</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione della circolazione ( per persona sovrappeso/sottopeso, consumo di alcol, disidratazione, inattività)</li> </ul> <b>Fasi di sviluppo</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inefficacia della termoregolazione secondaria all'età (es. neonato, anziano)</li> </ul>	
<b>Lesione, rischio di</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni delle funzioni cerebrali per ipossia (vertigini, sincope)</li> <li>X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)</li> <li>X Fatigue</li> <li>X Ipotensione ortostatica</li> <li>X Disturbi vestibolari</li> <li>X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)</li> <li>X Movimenti tonico-clonici (convulsioni)</li> </ul> <b>Trattamenti</b>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>X Lungo allettamento</li> <li>X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)</li> <li>X Gesso, stampelle, deambulatore, bastone</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione o perdita memoria a breve termine</li> <li>X Alterata capacità di (disidratazione, depressione)</li> <li>X Ambiente non familiare (es. Ospedale)</li> <li>X Scarpe inadatte,</li> <li>X Disattenzione del caregiver</li> <li>X Uso improprio degli ausili</li> <li>X Andatura instabile</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare</li> </ul>
---

<b>Liquidi, eccessivo volume di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare</li> </ul>	

<b>Liquidi, insufficiente volume di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete</li> </ul>	

<b>Memoria, compromissione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Alterazioni del SNC ( per malattia cerebrale degenerativa, ictus cerebrale, lesione/trauma cranico</li> <li>X Deficienze nutrizionali</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Eccessiva attenzione/preoccupazione per se stessi (per lutto, ansia, depressione)</li> <li>X Difficoltà di concentrazione (per stress, disturbi del sonno, dolore, inadeguata stimolazione intellettuale, distrazioni)</li> </ul>	

<b>Mobilità, compromissione /rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X riduzione della forza e della resistenza per compromissione neuromuscolare ( malattie autoimmunitarie, del sistema nervoso, respiratorie)</li> <li>X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)</li> <li>X rigidità delle articolazioni o contratture (per malattia infiammatoria, interventi endoprotesi ortopedica artic)</li> <li>X edemi</li> <li>X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)</li> <li>X forza/resistenza insufficienti per la deambulazione (protesi, stampelle, deambulatore)</li> </ul>	

<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>X fatigue</li> <li>X obesità</li> <li>X mancanza di motivazione</li> <li>X dispnea</li> <li>X dolore</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare</li> </ul>	
<b>Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio</b>	<b>X</b>
Vedere mobilità, compromissione, rischio	
<b>Nausea</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per gastroenterite acuta, ulcera gastrica, sindrome colon irritabile, pancreatite, infezioni, tossinfezioni alimentari, intossicazioni da farmaci, calcolosi renale, malessere da movimento, stress)</li> </ul>	
<b>Non adesione (a indicazioni terapeutiche)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Barriere alla comprensione (per deficit cognitivi/visivi/uditivi, difficoltà di memoria, ansia, fatigue, ridotta attenzione, problemi motivazionali)</li> </ul>	
<b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, disturbi neuromuscolari)</li> <li>X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)</li> <li>X Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)</li> <li>X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)</li> <li>X Diarrea</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Anziani (inappetenza e disfagia)</li> </ul>	

<b>Nutrizione superiore al fabbisogno</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Riduzione dei sensi di gusto/olfatto <b>Fasi di sviluppo</b> X Adulto/persona anziana: diminuzione del modello di attività /di fabbisogno metabolico	
<b>Respirazione, inefficace funzionalità, rischio</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Secrezioni eccessive o dense (per infezione, infiammazione, allergia, patologie cardiopolmonari, fumo) X Immobilità stasi delle secrezioni, tosse inefficace (per malattie del SN, depressione del SNC/trauma cranico, ictus cerebrale, tetraplegia) <b>Trattamenti</b> X Immobilità (per effetto sedativo di farmaci, droghe o sostanze chimiche, anestesia) X Soppressione del riflesso della tosse X Effetti della tracheostomia (alterazione delle secrezioni) <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Immobilità (per intervento chirurgico/trauma, compromissione percettiva/cognitiva, fatigue, dolore, paura, ansia)	
<b>Soffocamento, rischio Vedere rischio di lesione</b>	<b>X</b>
<b>Stipsi</b>	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> X Innervazione difettosa, debolezza della muscolatura pelvica immobilità (per lesioni/traumi del midollo spinale, ictus cerebrale, malattia neurologica, demenza) X Riduzione del metabolismo (per ipotiroidismo, iperparatiroidismo, obesità, uremia, neuropatia diabetica) X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore) X Disturbi della mobilità secondari a sindrome da intestino irritabile <b>Trattamenti</b> X Effetti collaterali di farmaci (antidolorifici a base morfina) X Effetti sulla peristalsi dell'anestesia e della manipolazione chirurgica X Uso abituale di lassativi <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico) X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata X Paura di dolore rettale o cardiaco X Incapacità di percepire i segnali intestinali	

<b>Stress, sovraccarico psicofisico</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Perdita reale o prevista di una persona significativa (per morte, divorzio, trasloco, servizio militare)</li> <li>X Perdite funzionali</li> </ul>	
<b>Trasloco, stress da</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione della capacità di adattamento a nuovi ambienti per peggioramento dello stato di salute fisico (difficoltà fisiche), psico-sociale (stress prima del trasloco, depressione, diminuzione dell'autostima)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Risorse economiche insufficienti</li> <li>X Elevati livelli di cambiamenti ( per ammissione in strutture residenziali/di assistenza)</li> <li>X Perdita di legami sociali/familiari</li> <li>X Abbandono</li> <li>X Modifica delle relazioni familiari</li> <li>X Scarsa/nessuna preparazione per l'imminente spostamento</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana: necessità della vicinanza dei familiari per l'assistenza, ammissione in struttura di assistenza</li> </ul>	

**Allegato 3**

<b>PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTE TRATTATI</b>	
Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)	
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per riduzione della gittata cardiaca	<b>X</b>
RC per aritmie	<b>X</b>
RC per edema polmonare	<b>X</b>
RC per trombosi venosa profonda	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria</b>	
RC per ipossiemia	<b>X</b>
RC per atelectasia/polmonite	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per ipo/iperglicemia	<b>X</b>
RC per squilibri elettrolitici	<b>X</b>
RC per sepsi	<b>X</b>
RC per infezioni opportunistiche	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria</b>	
RC per ritenzione urinaria acuta	<b>X</b>
RC per insufficienza renale	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione neurologica / sensoriale</b>	
RC per crisi convulsiva	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per sanguinamento gastrointestinale	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione muscoloscheletrica</b>	
RC per fratture patologiche	<b>X</b>
RC per lussazione	<b>X</b>
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	<b>X</b>
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	<b>X</b>



## Allegato 4

### APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

**Le persone possono essere inserite in R.S.A.:**

- 1. In convenzionamento da parte dell'ASL (previa valutazione multidimensionale predisposta dalla Unità Valutativa Geriatrica)**
- 2. Privatamente**

**Allo studente infermiere è offerto di partecipare:**

- **Al 1° contatto con la struttura: incontro , su appuntamento, per colloquio conoscitivo con la struttura e con l'anziano da inserire e/o caregiver.**
- **Alla definizione della intensità assistenziale: in seguito al colloquio, in base a caratteristiche oggettive (scale di valutazione), si definisce l'intensità assistenziale della persona da inserire all'interno della residenza (qualora l'inserimento fosse privato). In caso di convenzionamento da parte dell'ASL si applica l'intensità assistenziale definita dall'U.V.G.**
- **All'accoglienza in struttura:**
  - 1. Colloquio di accoglienza con la persona assistita ed i familiari/caregiver; coinvolge diversi professionisti (direttore sanitario, coordinatore infermieristico, infermiere, referente OSS, fisioterapista, psicologo), con l'obiettivo di stilare un piano assistenziale il più possibile personalizzato.**
  - 2. Compilazione della cartella sanitaria integrata informatizzata che consta di: anamnesi clinica e assistenziale, scale di valutazione, prescrizione terapia farmacologica.**
  - 3. Informazioni di carattere gestionale sulla struttura.**

- **All' aggiornamento del Piano Assistenziale Individuale**

**Allo studente infermiere, per una delle persone assistite, è offerta la predisposizione dell'accertamento e la sua presentazione, con proposta di pianificazione assistenziale, all'équipe. Le scale da utilizzare nell'accertamento sono: ADL Barthel, IADL, SPMSQ, A.Di.CO.**



- **All'assistenza diretta alla persona, erogata da Infermieri, O.S.S., Medici di Medicina Generale. Ogni studente sarà assegnato ad un nucleo RSA (20 ospiti residenti); per alcune attività, al fine di consentire sufficiente addestramento tecnico (es.prelievi ematici, medicazioni semplici e/o avanzate, gestione di dispositivi medici quali PEG, SNG, tracheostomie, uro e colostomie, pompe infusionali) lo studente potrà essere affiancato all'infermiere di piano (3 nuclei= 60 ospiti). La gestione della terapia farmacologica è informatizzata; la documentazione sanitaria è gestita attraverso una Cartella sanitaria integrata informatizzata (tutte le informazioni delle persone assistite vengono gestite attraverso un portale cloud in cui ogni figura sanitaria inserisce le informazioni relative l'assistenza della persona). E' inoltre possibile visionare una esperienza di telemedicina: attraverso un dispositivo elettronico, si possono effettuare ECG che vengono direttamente inviati e refertati dal cardiologo.**

La struttura offre inoltre allo studente infermiere la possibilità di :

- **Collaborare con altre figure professionali quali**
  - **Fisioterapista (possibilità di assistere ad una seduta riabilitativa in palestra per una persona assistita)**
  - **Geromotricista (possibilità di assistere alle sessioni di ginnastica riabilitativa collettiva).**
  - **Logopedista ( possibilità di assistere ad una seduta logopedia)**
  - **Dietista ( possibilità di assistere ad una valutazione dietistica e alla stesura di un piano dietetico personalizzato)**
  - **Psicogeriatra ( possibilità di assistere a visite e/o stesura dei piani terapeutici per gli ospiti della struttura)**
  - **Medico di Medicina Generale: in una zona della struttura è situato lo studio associato di sei Medici di Medicina Generale che visitano e assistono, oltre ai cittadini, anche gli ospiti della struttura ( progetto Sanità)**
  - **Terapista occupazionale (possibilità di assistere alle attività della terapia occupazionale, soprattutto con persone affette da disabilità fisiche, psichiche e cognitive).**
  - **Psicologo (possibilità di assistere agli incontri di stimolazione cognitiva del nucleo NAT, incontri individuali, corsi di lavoro stress correlato, stesura PAI)**
- **Osservare o sperimentare il modello di assistenza GENTALCARE.**



**E' un modello assistenziale che ritroviamo in maniera marcata nei nuclei NAT (Nucleo Alzheimer Temporaneo) della struttura che, anziché concentrarsi sul comportamento della persona affetta da deterioramento cognitivo, incoraggia un adattamento dell'ambiente fisico e sociale in cui la persona vive.**

- **Osservare o sperimentarsi nell'assistenza a persone disabili RAF disabili tipo B**

**E' inoltre presente in struttura il nucleo "Villa Mongrando", una residenza Assistenziale Flessibile per disabili, che può ospitare sino a 20 persone affette da disabilità psicofisica.**