



## OFFERTA FORMATIVA DELLA SEDE DI TIROCINIO

Contesto	
<p><b>Tutor clinico</b> Contatti e riferimenti</p>	<p>Nome <b>SARA</b> Cognome <b>MAMELI</b> Telefono 011/4393391 e-mail sara.mameli@unito.it</p>
<p><b>Struttura/servizio</b> Nominativo, ubicazione, ecc  N°locali, n° posti letto,</p>	<p>S.C. Cardiologia 1 presso Ospedale Maria Vittoria padiglione D 1° piano.</p> <p>1 infermeria 2 studi medici 1 studio del primario 1 vuotavasi 1 cucina 2 depositi 10 camere di degenza con bagno (20 posti letto di cui due dedicati esclusivamente al day hospital)</p>
<p>Orari apertura al pubblico,</p>	<p>Visite parenti: 12.30 - 16.00; 18.30 - 21.30</p>
<p>Orari di lavoro,</p>	<p>Il personale ruota su tre turni: - mattino dalle 7.00 alle 14.42. - pomeriggio dalle 14.32 alle 22.35. - notte dalle 22.25 alle 7.10.</p>
<p>Figure professionali</p>	<p>Medico – Infermiere – Operatore Socio Sanitario</p>
<p>Risorse strumentali</p>	<p>All'interno dell'unità operativa, gli studenti hanno la possibilità di utilizzare diversi presidi biomedicali, quali: elettrocardiografo, sistema telemetrico per il monitoraggio elettrocardiografico, ecocardiografo portatile per l'incannulamento venoso periferico e monitor-defibrillatore. Inoltre nel periodo di tirocinio saranno individuate con lo studente due giornate osservative per approfondire l'opportunità di apprendimento: una in ambulatorio</p>



<p>Servizi agli studenti (mensa, biblioteca, accesso internet, ecc)</p>	<p>(ecocardiografia trans toracica e trans esofagea, eco stress, monitoraggio holter 24h, test ergometrico, approfondimento dell'elettrocardiogramma) e una in emodinamica/elettrofisiologia (coronarografia ed eventuale angioplastica, cateterismo cardiaco, impianto di pace-maker e/o defibrillatore). Uso di programmi informatici per compilazione cartella clinica (Galileo) e terapia (Prisma)</p> <p>Si può usufruire per la pausa psicofisica del locale antistante lo spogliatoio della palazzina C, attrezzato con tavoli e sedie; oppure accedere ai locali mensa attraverso due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pagare i buoni pasto presso la Tesoreria della Banca San Paolo sita presso il Maria Vittoria e ritirare i buoni presso gli uffici dell'economato di via Medail. Il buono pasto dovrà essere consegnato presso il locale mensa il giorno precedente.</li><li>- Portare il pasto da casa ed usufruire del locale mensa con la possibilità di riscaldare il pasto nel forno a microonde presente nel locale. (come da regolamento aziendale non si può accedere in divisa)</li></ul> <p>Accesso a internet in qualsiasi momento del suo tirocinio attraverso le credenziali dell' infermiere affiancatore.</p>
<p><b>Contatti e riferimenti</b></p>	<p>Indirizzo via Cibrario, 72 Torino Telefono 0114393391/397 Fax 0114393334</p>
<p><b>Come raggiungere il servizio</b> Mappa percorso Mezzi pubblici</p>	<p>Mezzi pubblici: 9 - 13 - 16 - 71</p>



## Allegato 1

### **Problemi di salute / Problemi clinici / Percorso diagnostico terapeutici prevalentemente trattati**

Selezionare (X) i problemi di salute prevalenti e indicare le patologie più frequenti

#### **Malattie Cardiovascolari**

**X**

Sindrome coronarica acuta (STEMI,NSTEMI e angina instabile), scompenso cardiocircolatorio con eventuale stimolazione biventricolare, pericardite e miocardite, endocardite valvolare, malattie della conduzione atrio-ventricolare con impianto di pace-maker e/o di defibrillatore definitivo,cardiopatie congenite.



## Allegato 2

### Diagnosi Infermieristiche prevalentemente trattate

Selezionare (X) le caselle relative alle Diagnosi Infermieristiche e ai fattori correlati di interesse  
(riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche – 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)

Ansia	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Qualsiasi fattore che interferisca con i bisogni relativi ad alimentazione, respirazione, comfort, sicurezza</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Minaccia reale o percepita al concetto di sé (fallimento, modificazione dello status, mancato riconoscimento da parte degli altri...)</li> <li>X Minaccia reale o percepita all'integrità biologica (per malattia, violenza, procedure invasive, stato terminale)</li> <li>X Cambiamento ambientale reale o percepito (trasloco, ospedalizzazione, pensionamento, condizione di rifugiato, reclusione, calamità naturali, rischi per la sicurezza...)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Adulto: minaccia al concetto di se per gravidanza, ruolo genitoriale, cambiamento di carriera, effetti dell'invecchiamento, complicanze di una precedente gravidanza, aborto, o morte del feto, insufficiente conoscenza dell'esperienza del travaglio</li> <li>X Persona anziana: minaccia al concetto di se secondaria a perdite sensoriali, motorie, problemi finanziari, cambiamenti legati al pensionamento</li> </ul>	

Attività, intolleranza all'attività	X
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <p>Compromissione del sistema di apporto di ossigeno per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Sistema cardiaco (insufficienza cardiaca, valvolare, aritmie, infarto del miocardio, cardiopatia congenita, angina)</li> <li>X Sistema circolatorio (anemia, ipovolemia, arteriopatia periferica)</li> </ul> <p>Aumento del fabbisogno metabolico per</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Infezioni acute o croniche (virali, epatite, mononucleosi, disordini endocrini/ metabolici)</li> <li>X Malattie croniche (renali, infiammatorie, neurologiche, epatiche, muscolo scheletriche)</li> <li>X Inadeguatezza delle fonti energetiche (per obesità, dieta inadeguata, malnutrizione)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aumento del fabbisogno metabolico (per tumore maligno, intervento chirurgico, indagini diagnostiche, orario e frequenza trattamenti)</li> <li>X Compromissione del trasporto dell'ossigeno ( per ipovolemia, prolungato riposo a letto)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Inattività (secondaria a depressione, mancanza di motivazione, stile di vita sedentario, insufficiente conoscenza)</li> <li>X Aumento del fabbisogno metabolico (per utilizzo di ausili come deambulatore /stampelle /tutori, stress, dolore, barriere ambientali come ad es. scale, estremi climatici, inquinamento dell'aria)</li> <li>X Inadeguata motivazione (secondaria ad utilizzo di ausili, paura di cadere, depressione, obesità, dolore, dispnea)</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Processo di invecchiamento con diminuzione della forza e del tonico muscolare, comparsa di deficit sensoriali</li> </ul>	



<b>Cadute, rischio</b> Vedere lesione, rischio	<b>X</b>
---	----------

<b>Caregiver, tensione nel ruolo di /Rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Esigenza di assistenza continua/ complessa (per condizioni debilitanti acute/progressive, tossicodipendenza, malattia dal decorso imprevedibile, demenza progressiva, malattia mentale cronica, disabilità)</li> </ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Responsabilità assistenziali legate per tutto l'arco delle 24 ore o assistenza che richiede tempo (dialisi, trasporto)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Aspettative non realistiche dell'assistito nei confronti del caregiver</li> <li>X Modello di coping inefficace</li> <li>X Salute fisica compromessa</li> <li>X Relazioni inadeguate o disfunzioni familiari</li> <li>X Durata dell'assistenza richiesta</li> <li>X Isolamento</li> <li>X Pause di riposo/svago insufficienti o</li> <li>X Risorse economiche insufficienti</li> <li>X Assenza o non disponibilità di sostegno</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Esigenza di assistenza continua secondaria a disabilità fisiche (specificare)</li> </ul>	

<b>Casa, compromessa gestione</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Compromissione delle capacità funzionali secondarie a malattia cronica debilitante (diabete mellito, sclerosi multipla, ictus cerebrale, cancro, artrite, insufficienza cardiaca, m. Parkinson, BPCO, distrofia muscolare)</li> </ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Modificazioni delle capacità funzionali di un membro della famiglia (specificare) per lesione (es. frattura di un arto/lesione del midollo spinale), intervento chirurgico, alterazione dello stato mentale (vuoti di memoria, depressione, ansia-panico grave), abuso di sostanze.</li> <li>X Mancata disponibilità di un sistema di sostegno</li> <li>X Perdita di un familiare</li> <li>X Deficit di conoscenze</li> <li>X Insufficienza di risorse economiche</li> </ul> <p><b>Fasi di sviluppo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>X Persona anziana (correlata all'esigenza di cure molteplici per un familiare che presenta deficit cognitivi, motori, sensoriali)</li> </ul>	



<b>Comunicazione, compromissione e Comunicazione verbale, compromissione</b> (incapacità a pronunciare le parole ma è in grado di comprendere)	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Mandata disponibilità di apparecchio acustico o suo malfunzionamento
- X Barriere psicologiche (paura, timidezza)
- X Mancanza di riservatezza
- X Barriera linguistica (non disponibilità di interprete)

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana (perdite uditive)

<b>Concetto di se, disturbo del</b>	<b>X</b>
-------------------------------------	----------

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Variazioni dell'aspetto, dello stile di vita, di un ruolo o delle risposte altrui (per malattia cronica, dolore, trauma grave, perdita parti del corpo / funzioni organiche)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Immobilità o perdita di funzioni
- X Rapporti insoddisfacenti parentali /coniugali

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana (perdita di ruoli/responsabilità)

<b>Confusione mentale acuta</b>	<b>X</b>
---------------------------------	----------

Fattori correlati

**Fattori di rischio**

Improvvisa insorgenza di ipossia cerebrale o disturbi del metabolismo cerebrale per

- X Squilibri idroelettrolitici (disidratazione, ipovolemia, acidosi/alcalosi, iper/ipo calcemia, ipopotassiemia, ipo/ipernatremia, ipo/iperglicemia)
- X Disturbi cardiovascolari (infarto miocardio, insufficienza cardiaca congestizia, aritmie, blocco cardiaco, arterite temporale, ematoma subdurale)
- X Disordini respiratori (BPCO, embolia polmonare, TBC, polmonite)
- X Infezioni (sepsi, meningite, encefalite, infezione delle vie urinarie nell'anziano)

<b>Coping inadeguato della famiglia</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati

**Biofisiopatologici**

- X Compromissione della capacità di esercitare la responsabilità di ruolo per malattia acuta/cronica

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Compromissione della capacità di gestire in modo costruttivo gli agenti stressanti (per dipendenza da sostanze, scarsa autostima, alcolismo, storia di relazioni inefficaci con i propri genitori, modelli di ruolo negativi, storia di relazioni abusive)



<b>Coping inefficace</b>	<b>X</b>
--------------------------	----------

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Cronicità della condizione
- X Complessità del regime di autocura
- X Alterazione dello stato d'animo

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Criticità delle relazioni con genitori/caregiver
- X Disorganizzazione del sistema familiare
- X Inefficace capacità di problem solving
- X Sostegno insoddisfacente, sovraccarico sensoriale ( ambiente di fabbrica, urbanizzazione, affollamento, inquinamento acustico, attività eccessiva)
- X Inadeguate risorse psicologiche (per scarsa autostima, considerazione di se negativa, senso di impotenza, mancanza di motivazione per reagire, modelli di ruolo negativi)

**Fasi di sviluppo**

- X Adulto giovane età: scelte di carriera, condizione di genitore, matrimonio, abbandono della casa dei genitori, esigenze formative.
- X Adulto mezza età: segni fisici di invecchiamento, bisogni relativi alla condizione sociale, problemi con i familiari, della cura dei figli, pressioni legate alla carriera, genitori anziani.
- X Persona anziana: inadeguatezza delle risorse psicologiche per modificazioni fisiche, reazioni degli altri verso l'anziano, pensionamento, cambiamento di residenza, di condizioni economiche

<b>Cura di sé, deficit (alimentazione)</b>	<b>X</b>
<b>Incapacità di (specificare):</b> <b>X tagliare gli alimenti e/o aprire le confezioni</b> <b>X portare il cibo alla bocca</b>	

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Debolezza muscolare

**Trattamenti**

- X Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)
- X Affaticamento e dolore post operatori

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Dolore
- X Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare



<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> lavare il proprio corpo o parti <input checked="" type="checkbox"/> procurarsi l'acqua <input checked="" type="checkbox"/> regolare la temperatura o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare <b>Trattamenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b> <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare	
<b>Cura di sé, deficit (bagno/igiene personale)</b> Ridotta e/o incapacità di (specificare): <input checked="" type="checkbox"/> mettersi o togliersi vestiti, allacciare i vestiti <input checked="" type="checkbox"/> curare il proprio aspetto <input checked="" type="checkbox"/> acquistare o cambiare capi di vestiario <input checked="" type="checkbox"/> o il flusso dell'acqua <input checked="" type="checkbox"/> percepire il bisogno di cure igieniche	<b>X</b>
Fattori correlati <b>Fisiopatologici</b> <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare <b>Trattamenti</b> <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...) <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori <b>Situazionali (personali, ambientali)</b> <input checked="" type="checkbox"/> Dolore <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza <b>Fasi di sviluppo</b>	





X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

<p><b>Cura di sé, deficit (eliminazione urinaria e fecale)</b>  <b>Incapacità o mancanza di volontà per (specificare):</b>  <input checked="" type="checkbox"/> servirsi del gabinetto/comoda  <input checked="" type="checkbox"/> trasferirsi sul gabinetto/comoda  <input checked="" type="checkbox"/> eseguire pratiche igieniche adeguate  <input checked="" type="checkbox"/> pulire il gabinetto o la comoda  <input checked="" type="checkbox"/> sistemare gli indumenti per servirsi del gabinetto</p>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati  <b>Fisiopatologici</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)  <b>Trattamenti</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)  <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori  <b>Situazionali (personali, ambientali)</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Dolore  <input checked="" type="checkbox"/> Scarsa motivazione  <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento  <input checked="" type="checkbox"/> Confusione mentale  <input checked="" type="checkbox"/> Ansia che paralizza</p> <p><b>Fasi di sviluppo</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare</p>	

<p><b>Cura di sé, deficit (strumentale)</b>  <b>Difficoltà a (specificare)</b>  <input checked="" type="checkbox"/> usare il telefono  <input checked="" type="checkbox"/> accedere ai mezzi di trasporto  <input checked="" type="checkbox"/> lavare e stirare  <input checked="" type="checkbox"/> preparare i pasti  <input checked="" type="checkbox"/> fare la spesa  <input checked="" type="checkbox"/> gestire il denaro  <input checked="" type="checkbox"/> assumere i farmaci</p>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati  <b>Fisiopatologici</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Debolezza muscolare per (specificare)  <b>Trattamenti</b>  <input checked="" type="checkbox"/> Uso di dispositivi esterni (apparecchio gessato, tutori ortopedici, infusione endovenosa...)  <input checked="" type="checkbox"/> Affaticamento e dolore post operatori</p>	



**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Dolore
- X Scarsa motivazione
- X Affaticamento
- X Confusione mentale
- X Ansia che paralizza

**Fasi di sviluppo**

- X Diminuita capacità motoria e visiva o a debolezza muscolare

**Deambulazione, compromissione, rischio**

Vedere mobilità, compromissione, rischio

X

**Dolore acuto (Grave fastidio o disagio che dura da 0 a 6 mesi)**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)

**Trattamenti**

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomtria invasiva)
- X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- X Risposta allergica
- X Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- X Ansia grave e repressa

**Dolore cronico (Continuo/ intermittente che dura da più di 6 mesi)**

X

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi secondari a

- X Disordini viscerali (cardiaci, renali, epatici, intestinali, polmonari)
- X Disordini vascolari (vasospasmo, occlusione, flebite, vasodilatazione/cefalea)
- X Fatigue, malessere o prurito secondari a malattie infettive (rosolia, pancreatite, epatite, mononucleosi, varicella)

**Trattamenti**

- X Trauma tissutale e spasmi muscolari riflessi (per intervento chirurgico, ustione, indagini diagnostiche/venipuntura/biopsia, scansiomtria invasiva)
- X Per nausea e vomito secondari a chemioterapia, anestesia, effetti collaterali (specificare)

**Situazionali (personali, ambientali)**



- X Febbre
- X Immobilità/posizionamento inappropriato
- X Punti di pressione (es.ingessatura o bendaggio stretti)
- X Risposta allergica
- X Bisogno di dipendenza non soddisfatto
- X Ansia grave e repressa

### Eliminazione urinaria compromessa

**X**

Per Incontinenza urinaria (specificare):

- X Totale (continua, senza presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)
- X Da sforzo ( perdita involontaria di urine per aumento della pressione addominale)
- X Da urgenza (perdita involontaria di urine per urgenza minzionale)
- X Funzionale (per incapacità di raggiungere in tempo il gabinetto)
- X Riflessa (senza sensazione di pienezza vescicale o urgenza minzionale)
- X Da rigurgito ( presenza di distensione della vescica e/o ritenzione di urine)

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- X Anomalie congenite delle vie urinarie
- X Diminuita capacità vescicale/irritazione vescicale (per infezione, glicosuria, carcinoma, uretrite, trauma)
- X Diminuzione dei segnali vescicali o del loro riconoscimento (per infezioni/tumori/lesioni midollo spinale, neuropatia alcolica e/o diabetica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, farmaci alfa adrenergici)

#### Trattamenti

- X Effetti di intervento chirurgico sullo sfintere vescicale (prostatectomia, dissezione pelvica estensiva)

### Fatigue

**X**

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- X Inadeguata ossigenazione tissutale ( per BPCO, insufficienza cardiaca, anemia, malattia vascolare periferica)
- X Alterazioni biochimiche (per malattie endocrine e metaboliche come diabete mellito, ipotiroidismo, malattie ipofisarie, AIDS, M Addison, cirrosi epatica, insufficienza renale)
- X Debolezza muscolare (per miastenia gravis, sclerosi multipla,, SLA, M. Parkinson, AIDS)

#### Situazionali (personali, ambientali)

- X Diminuzione prolungata dell'attività (per ansia, febbre, diarrea, dolore, isolamento sociale, nausea/vomito, depressione, obesità)



- X Stress emotivo
- X Disturbi del sonno

### Immobilizzazione, sindrome da

X

Fattori correlati

#### Trattamenti

- X Intervento chirurgico
- X Linee venose
- X Immobilità prescritta

#### Situazionali (personali, ambientali)

- X Depressione
- X Fatigue
- X Stato di debilitazione
- X Dolore

#### Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: ridotta agilità motoria, debolezza muscolare, demenza presenile

### Incontinenza fecale

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- X Compromissione dello sfintere rettale ( per chirurgia anale/rettale, lesioni ostetriche, neuropatia periferica)
- X Compromissione delle funzioni cognitive
- X Iperdistensione rettale per stipsi cronica
- X Mancato controllo dello sfintere volontario (per malattia neuromuscolare progressiva compressione/lesione del midollo spinale, ictus cerebrale, sclerosi multipla)
- X Trattamenti
- X Compromessa capacità del di fungere da serbatoio fecale per colectomia, proctite da radiazioni.

#### Situazionali (personali, ambientali)

- X Incapacità di riconoscere, interpretare o rispondere ai segnali intestinali (per depressione, compromissione delle funzioni cognitive)

### Incontinenza urinaria da sforzo

X

Fattori correlati

#### Fisiopatologici

- X Anomalie congenite delle vie urinarie
- X Alterazioni degenerative della muscolatura pelvica e dei legamenti per deficienza estrogenica

#### Situazionali (personali, ambientali)

- X Elevata pressione intra-addominale e debolezza della muscolatura pelvica per obesità, attività sessuale, gravidanza, inadeguata igiene personale
- X Debolezza della muscolatura pelvica e dei legamenti per parto, recente rilevante calo ponderale

#### Fasi di sviluppo

- X Persona anziana: perdita di tono muscolare



Incontinenza urinaria da urgenza	X
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
X Diminuzione della capacità vescicale per infezione, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, trauma, uretrite, neuropatia diabetica, neuropatia alcolica, disturbi/lesioni neurologiche/tumori/infezioni, parkinsonismo	
<b>Trattamenti</b>	
X Diminuzione della capacità vescicale per intervento chirurgico addominale, X Periodo successivo a cateterismo vescicale a permanenza	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
X Irritazione dei recettori vescicali da stiramento per uso di alcol, caffeina, eccessiva assunzione di liquidi X Diminuzione della capacità vescicale secondaria a minzioni frequenti	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
X Bambino: limitata capacità vescicale X Persona anziana: diminuita capacità vescicale	

Incontinenza urinaria funzionale	X
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
X Diminuzione di stimoli vescicali/compromessa capacità di riconoscerli per trauma, infezione, tumore cerebrale, parkinsonismo, sclerosi multipla, neuropatia alcolica, malattie demielinizzanti, ictus cerebrale, demenza progressiva	
<b>Trattamenti</b>	
X Riduzione del tono vescicale per uso di antistaminici, terapia immunosoppressiva, adrenalina, diuretici, anticolinergici, tranquillanti, sedativi, miorilassanti	
<b>Situazionali (personali, ambientali)</b>	
X Compromissione della mobilità X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, spondine laterali, ambiente non familiare)	
<b>Fasi di sviluppo</b>	
X Persona anziana: perdite motorie/sensitive	

Incontinenza urinaria totale (compromessa eliminazione urinaria)	X
Fattori correlati	
<b>Fisiopatologici</b>	
X Anomalie congenite delle vie urinarie X Diminuita capacità vescicale o irritazione vescicale per trauma, carcinoma, infezione uretrite, glicosuria X Diminuzione dei segnali vescicali o compromessa capacità di riconoscerli per infezione/tumore/lesione del midollo spinale, neuropatia diabetica/alcolica, malattie	



demyelinizzanti, ictus cerebrale, parkinsonismo, lesione cerebrale, sclerosi multipla

**Trattamenti**

- X Effetti del trattamento chirurgico sullo sfintere vescicale per prostatectomia, dissezione pelvica estensiva
- X Strumentazione diagnostica
- X Riduzione del tono muscolare per per anestesia generale o spinale, terapia farmacologica e iatrogenesi (farmaci miorellassanti, anestetici, diuretici, antistaminici, anticolinergici, immunodepressori, adrenalina, ansiolitici)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Compromissione della mobilità
- X Diminuita attenzione nei confronti degli stimoli vescicali per depressione, soppressione intenzionale, confusione mentale
- X Barriere ambientali per l'accesso al bagno (gabinetto distante, letto troppo alto, scarsa illuminazione, sponde laterali, ambiente non familiare)

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: perdite motorie/sensitive

**Infezione, rischio di**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Compromissione della circolazione per linfedema, obesità, malattia vascolare periferica

**Trattamenti**

- X Sede di possibile invasione di microorganismi per intervento chirurgico, intubazione, linee invasive, nutrizione parenterale totale, dialisi, nutrizione enterale

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Compromissione delle difese dell'ospite per malattie infettive, stress, malnutrizione, prolungata degenza in ospedale, fumo, prolungata immobilità

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: maggiore vulnerabilità per diminuzione della risposta immunitaria, condizione debilitante, malattia cronica)

**Insonnia**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Compromissione del trasporto di ossigeno (per angina, disturbi circolatori/respiratori, arteriosclerosi periferica)
- X Compromissione dell'eliminazione fecale o urinaria (per diarrea, disuria, ritenzione, incontinenza, stipsi, pollacchiuria)

**Situazionali (personali, ambientali)**



- X Eccessivo dormire di giorno
- X Depressione
- X Inadeguata attività fisica durante il giorno
- X Dolore cronico
- X Risposte ansiose
- X Modifiche ambientali (specificare)
- X Paura

**Integrità mucosa orale, compromissione**

**X**

Fattori correlati

- X Inadeguata igiene orale
- X Incapacità di provvedere all'igiene orale

**Lesione, rischio di**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Alterazioni della mobilità (ictus cerebrale, artrite, parkinsonismo, perdita di un arto, compromissione della vista/udito)
- X Fatigue
- X Ipotensione ortostatica
- X Inadeguata consapevolezza dei rischi ambientali (confusione mentale)

**Trattamenti**

- X Lungo allettamento
- X Effetti sulla mobilità/sensorio (sedativi, miorilassanti...specificare)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Diminuzione o perdita memoria a breve termine
- X Alterata capacità di giudizio ( per stress, droghe, alcol, disidratazione, depressione)
- X Ambiente non familiare (es. Ospedale)
- X Scarpe inadatte,
- X Uso improprio degli ausili
- X Storia di incidenti
- X Andatura instabile

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: alterata capacità di giudizio (per deficit cognitivi), stile di vita sedentario, perdita di forza muscolare

**Liquidi, eccessivo volume di**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Compromissione dei meccanismi regolatori (per insufficienza renale acuta/cronica, disfunzioni endocrine, anomalie sistemiche metaboliche, lipoedema)
- X Anomalie venose e arteriose (vene varicose, vasculopatia periferica,. Trombosi, flebite, immobilità, linfoedema, infezioni, trauma, neoplasie)

**Trattamenti**

- X Ritenzione di sodio e acqua (terapia corticosteroidea)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Eccessivo apporto di sodio/liquidi
- X Inadeguato apporto proteico (dieta squilibrata, malnutrizione)



- X Ristagno venoso declive/venostasi ( per immobilità, prolungata stazione eretta/posizione seduta, gesso/fasciatura stretta)

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: compromissione del ritorno venoso per aumento delle resistenze periferiche e diminuzione dell'efficienza valvolare

**Liquidi, insufficiente volume di**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X Eccessiva emissione di urine (per diabete mellito insipido, diabete mellito scompensato)  
X Perdite (febbre, aumento del metabolismo, drenaggio accentuato, ferite, peritonite, diarrea, menorragia)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X Vomito/nausea  
X Diminuita motivazione a bere (depressione, fatigue)  
X Dieta scorretta/digiuno  
X Difficoltà a deglutire/assumere alimenti (dolore orale, fatigue)  
X Perdita eccessiva (cateteri a permanenza, drenaggi)  
X Uso eccessivo di lassativi o clisteri, diuretici, alcol, caffeina

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: aumentata vulnerabilità a ridotta riserva idrica, ridotta sensazione di sete

**Mobilità, compromissione /rischio di**

**X**

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- X riduzione della forza e della resistenza per compromissione muscoloscheletrica (fratture, malattie del tessuto connettivo, condizioni cardiache)  
X edemi  
X apparecchi esterni (gesso/splint, corsetto ortopedico, catetere venoso)

**Situazionali (personali, ambientali)**

- X fatigue  
X obesità  
X mancanza di motivazione  
X dispnea

**Fasi di sviluppo**

- X Persona anziana: diminuzione dell'agilità e debolezza muscolare

**Mobilità nel letto, mobilità con la sedia a rotelle, compromissione /rischio**

**Vedere mobilità, compromissione, rischio**

**X**

**Nausea**

**X**

Fattori correlati

**Trattamenti**

- X Effetti dell'anestesia





<b>Non adesione (a indicazioni terapeutiche)</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>X Compromessa capacità di prestazione a causa di una disabilità (scarsa memoria, deficit motori/sensitivi)</li><li>X Aumento dei sintomi correlati alla malattia nonostante la precedente adesione al regime terapeutico consigliato</li></ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>X Effetti collaterali della terapia</li><li>X Ambiente non terapeutico</li><li>X Terapia complessa non controllata/prolungata</li><li>X Costo economico della terapia</li><li>X Pregresse esperienze di regime terapeutico consigliato inefficace</li></ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>X Presenza di barriere per l'accesso (per problemi di mobilità/trasporto/economici, mancanza di assistenza per i figli, tempo inclemente)</li><li>X Barriere all'assistenza secondarie a mancanza di alloggio</li><li>X Modificazione dello stato lavorativo</li></ul>	

<b>Nutrizione inferiore al fabbisogno, rischio di</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>X Disfagia (per ictus cerebrale, M.di Parkinson, palatoschisi, distrofia muscolare, paralisi cerebrale, paralisi facciale, SLA, disturbi neuromuscolari)</li><li>X Diminuzione dell'appetito (per alterazioni dello stato di coscienza)</li></ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>X Diminuzione dell'appetito (per nausea, vomito, isolamento sociale, stress, depressione, allergie)</li><li>X Incapacità di procurarsi gli alimenti (per limitazioni fisiche, problemi finanziari/ di trasporto)</li><li>X Incapacità di masticare (per adentulia, carie, protesi non adatta)</li><li>X Diarrea</li></ul>	

<b>Stipsi</b>	<b>X</b>
<p>Fattori correlati</p> <p><b>Fisiopatologici</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>X Diminuita risposta al bisogno di defecare (disturbi dell'umore)</li><li>X Dolore alla defecazione (per emorroidi, lesione dorsale)</li><li>X Diminuita peristalsi secondaria a ipossia cardiaca/polmonare</li></ul> <p><b>Trattamenti</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>X Effetti collaterali di farmaci (specificare)</li><li>X Uso abituale di lassativi</li></ul> <p><b>Situazionali (personali, ambientali)</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>X Diminuzione della peristalsi (per immobilità, gravidanza, stress, mancanza di esercizio fisico)</li><li>X Modello di evacuazione irregolare</li><li>X Mancanza di riservatezza</li><li>X Dieta priva di scorie, assunzione di liquidi inadeguata</li><li>X Paura di dolore rettale o cardiaco</li></ul>	



- |   |
|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Valutazioni errate<br><input checked="" type="checkbox"/> Incapacità di percepire i segnali intestinali |
|---|

<b>Stress, sovraccarico psicofisico</b>	<b>X</b>
---	----------

Fattori correlati

**Fisiopatologici**

- |  |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Necessità di far fronte a malattie acute, croniche, terminali, nuove diagnosi, condizioni deturpanti |
|--|



**Allegato 3**

<b>PROBLEMI COLLABORATIVI PRELEVALEMENTEMENTE TRATTATI</b>	
Selezionare (X) le caselle relative ai problemi collaborativi di interesse (riferimenti bibliografici: L.J.Carpenito-Diagnosi infermieristiche - 5th. ed. C.E.A. Edizioni, 2010)	
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione cardiaca/ vascolare</b>	
RC per emorragia	X
RC per riduzione della gittata cardiaca	X
RC per aritmie	X
RC per edema polmonare	X
RC per trombosi venosa profonda	X
RC per ipovolemia	X
RC per sindrome compartimentale	X
RC per embolia polmonare	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione respiratoria</b>	
RC per ipossiemia	X
RC per pneumotorace	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione metabolica/immunitaria/ematopoietica</b>	
RC per ipo/iperglicemia	X
RC per squilibri elettrolitici	X
RC per sepsi	X
RC per acidosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per alcalosi (metabolica, respiratoria)	X
RC per reazione allergica	X
Rc per trombocitopenia	X
RC per infezioni opportunistiche	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione renale / urinaria</b>	
RC per ritenzione urinaria acuta	X
RC per insufficienza renale	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per disfunzione gastrointestinale / epatica / biliare</b>	
RC per sanguinamento gastrointestinale	X
<b>Rischio di complicanze (RC) per effetti avversi (EA) della terapia farmacologica</b>	
RC per effetti avversi della terapia con farmaci anticoagulanti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci ansiolitici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci adrenocorticosteroidi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antidepressivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antiaritmici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipsicotici	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci antipertensivi	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci betabloccanti	X



RC per effetti avversi della terapia con farmaci calcioantagonisti	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci inibitori dei recettori dell'angiotensina	X
RC per effetti avversi della terapia con farmaci diuretici	X

#### Allegato 4

##### APPRENDIMENTO OFFERTO

In relazione alle diagnosi infermieristiche / problemi collaborativi sopra indicati, descrivere le opportunità formative per lo studente che caratterizzano la sede di apprendimento. Esempio: interventi assistenziali infermieristici, modelli organizzativi e/o di presa in carico assistenziale, attività di ricerca e innovazione.

Presso l'unità operativa di Cardiologia lo studente potrà apprendere i principali interventi assistenziali rivolti alla persona assistita affetta da patologie cardiache ischemiche, aritmiche e valvolari, collaborando con l'équipe multidisciplinare presente in reparto.

Potrà inoltre imparare a interpretare ed utilizzare i sistemi di monitoraggio dell'attività cardiaca ed assistere alle principali procedure diagnostico-terapeutiche cardiologiche.